



실제로 JEMPERLI를 투여하는 환자는 아님

치료 여정 전반에 걸쳐 사랑하는 사람 지원하기*

*이 정보는 귀하의 의료 서비스 제공자의 조언을 대체할 수 없습니다. 사랑하는 사람의 치료 계획에 대한 질문에 대한 답변을 가장 잘 얻을 수 있는 곳은 바로 케어팀입니다.

문서 전반에 걸쳐 중요 안전성 정보와 [투약 지침](#)을 포함한 전체 [처방](#) 정보는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



목차

<u>새로운 장 맞이하기</u>	4	<u>자신을 돌보기</u>	10
<u>케어 파트너에게 무엇을 기대합니까?</u>	6	<u>나만의 케어팀 만들기</u>	12
<u>케어 파트너: 케어팀의 중요한 멤버</u>	8		

승인된 용도

JEMPERLI는 성인에서 다음과 같은 질환을 치료하는 데 사용되는 처방약입니다.

- 자궁내막암(endometrial cancer, EC)이라 불리는 자궁암의 한 유형
 - JEMPERLI는 화학요법 약물인 카보플라틴 및 파클리탁셀과 함께 사용할 수 있고, 이후 다음의 경우에 JEMPERLI를 단독으로 사용할 수 있습니다.
 - 암이 자궁 밖으로 전이된 경우 (진행성) 또는,
 - 암이 재발한 경우.
 - JEMPERLI는 다음의 경우 단독으로 사용할 수 있습니다.
 - 실험실 검사에서 종양이 불일치 복구 결핍 (mismatch repair deficient, dMMR)인 것으로 나타나는 경우, 그리고
 - 암이 재발했거나 퍼진 경우(진행성 EC), 그리고
 - 귀하가 백금 함유 화학요법을 받았으며 이 요법이 효과가 없었거나 더 이상 효과가 없는 경우, 그리고
 - 귀하의 암이 수술이나 방사선으로 치료할 수 없는 경우.

JEMPERLI가 소아에서 안전하고 효과적인지 여부는 알려지지 않았습니다.

중요한 안전성 정보

JEMPERLI는 면역계와 함께 작용하여 특정 암을 치료할 수 있는 약물입니다. JEMPERLI는 면역계가 신체 어느 부위이든 정상 장기와 조직을 공격하게 만들어 그 작용 방식에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 문제는 때로 중증이 되거나 생명을 위협할 수 있으며, 사망에 이를 수도 있습니다. 이러한 문제는 여러 가지가 동시에 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 치료 중 언제든지 발생할 수 있으며, 치료가 끝난 후에도 발생할 수 있습니다.

문서 전반에 걸쳐 추가 중요 안전성 정보와 **투약** 지침을 포함한 전체 **처방 정보**는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli 
 (dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



실제로 JEMPERLI를 투여하는 환자는 아님

중요한 안전성 정보(계속)

다음에 포함하여 새로운 징후 또는 증상이 발생하거나 징후 또는 증상이 악화되는 경우 즉시 의료 서비스 공급자(healthcare provider, HCP)에게 전화하거나 진료를 받으십시오.

폐 문제. 징후와 증상은 기침, 숨참, 흉통을 포함할 수 있습니다.

장 문제. 징후와 증상은 설사 또는 평소보다 더 잦은 배변; 검고 타르 같은 끈적한 변 또는 혈액이나 점액이 있는 변; 중증의 위장 부위(복부) 통증 또는 압통을 포함할 수 있습니다.

간 문제. 징후와 증상은 피부 또는 눈의 흰자가 노랗게 변함, 중증 오심 또는 구토, 오른쪽 위 부위(복부) 통증, 진한색 소변(차색), 또는 평소보다 쉽게 출혈이나 멍이 생김 등을 포함할 수 있습니다.

문서 전반에 걸쳐 추가 중요 안전성 정보와 **투약** 지침을 포함한 전체 **처방 정보**는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

새로운 장 맞이하기

당신이 돌보는 사람이 자궁내막암 진단을 받으면 인생이 뒤집힐 수 있습니다. 예상치 못한 이 도전은 걱정에서 안도감, 절망에서 희망까지 다양한 감정을 불러일으킬 수 있습니다. 그리고 그건 아주 자연스러운 일입니다. 좋은 소식은 여러분이 이런 일을 혼자 겪고 있지 않다는 것입니다. 다른 케어 파트너도 이런 감정을 느낍니다.

간병인의 역할을 통해 사랑하는 사람의 전반적인 웰빙에 변화를 가져올 수 있습니다. 앞으로 나아갈 길을 조금 더 순탄하게 만들려면 이 가이드에서 무엇을 기대해야 할지 알아보고 지원을 받으십시오.

자궁내막암 소개

자궁내막암: 자궁 내벽 조직에서 시작되는 암입니다. 일반적인 증상으로는 비정상적인 질 출혈, 골반 통증 등이 있습니다.

진행성 또는 재발성: 자궁 밖으로 전이되었거나 치료 후 재발한 자궁내막암. 흔한 증상으로는 질 출혈, 식욕 감소, 설명할 수 없는 체중 감소, 또는 골반, 엉덩이, 배 또는 허리에 통증 등이 있습니다.



약 61,000건

미국에서 매년 진단됨



4명 중 1명에게 영향

자궁내막암 환자

자궁내막암에 대한 가족력 위험

자궁내막암은 특정 가족에서 발생하는 경향이 있습니다. 또한 일부 사람들은 유전적 질환인 **린치 증후군**이 있는 사람도 있습니다. 이는 자궁내막암에 걸릴 위험이 더 높다는 것을 의미합니다. 만약 당신의 부모님이나 다른 친척이 자궁내막암을 앓고 있다면, 이 질병의 징후와 증상에 대해 알아보십시오. 유전자 검사가 적절한지 의사에게 문의하십시오.

중요한 안전성 정보(계속)

다음은 포함하여 새로운 징후 또는 증상이 발생하거나 징후 또는 증상이 악화되는 경우 즉시 의료 서비스 공급자(healthcare provider, HCP)에게 전화하거나 진료를 받으십시오(계속).

호르몬 분비선 문제. 징후와 증상은 사라지지 않는 두통 또는 비정상적인 두통, 빛에 대한 눈민감성, 눈 문제, 빠른 심박동, 발한 증가, 극심한 피로, 체중 증가 또는 감소, 평소보다 더 배고픔 또는 갈증을 느낌, 평소보다 더 잦은 배뇨, 탈모, 추운 느낌, 변비, 목소리가 더 굵어짐, 어지러움 또는 실신, 성욕 감소, 예민함 또는 건망증과 같은 기분이나 행동의 변화를 포함할 수 있습니다.

문서 전반에 걸쳐 추가 중요 안전성 정보와 **투약** 지침을 포함한 전체 **처방 정보**는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

암 케어팀을 만나보십시오

자궁내막암 치료는 복잡할 수 있습니다. 그렇기 때문에 귀하의 사랑하는 사람은 전문적인 지식과 기술을 갖춘 사람들로 구성된 팀에 의해 보살핌을 받게 됩니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

관리 및 치료 감독

- 의료 종양학자
- 산부인과 종양학자
- 외과 종양학자
- 종양학 의사 보조원(PA)

추가 케어 관리

- 환자 내비게이터
- 완화간호팀
- 임상 사회복지사
- 정신 건강 전문가

일상적 케어 제공

- 종양학 전문간호사(NP)
- 종양학 간호사
- 케이스 관리자
- 주입 간호사

다른 팀원들

- 영양사/영양학자
- 방사선과 의사
- 재활 치료사
- 종양학 임상약사



유용한 팁

일반적인 질문에 대한 주 연락 담당자와 긴급 상황 발생 시 대처 방법을 알아보십시오.

중요한 안전성 정보(계속)

다음에 포함하여 새로운 징후 또는 증상이 발생하거나 징후 또는 증상이 악화되는 경우 즉시 의료 서비스 공급자(healthcare provider, HCP)에게 전화하거나 진료를 받으십시오(계속).

신장 문제. 징후와 증상은 소변의 양이나 색의 변화, 소변 내 혈액, 발목 부종 또는 식욕 상실을 포함할 수 있습니다.

피부 문제. 징후와 증상은 발진; 가려움; 피부 물집 또는 벗겨짐; 림프절 부종; 구강 또는 코, 인후 또는 생식기 부위의 통증성 상처 또는 궤양; 발열 또는 독감 유사 증상을 포함할 수 있습니다.

문서 전반에 걸쳐 추가 중요 안전성 정보와 **투약** 지침을 포함한 전체 **처방 정보**는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



실제로 JEMPERLI를 투여하는 환자는 아님

케어 파트너에게 무엇을 기대합니까?

개인의 암 투병 여정과 그 과정에서 필요한 사항은 서로 다릅니다. 간병인으로서 많은 시간은 사랑하는 사람의 신체적 요구를 돌보는 데 소비될 수 있습니다. 그리고 자궁내막암 진단은 종종 슬픔, 분노 또는 걱정으로 이어질 수 있기 때문에 환자와 케어팀의 추가 지원이 필요할 수도 있습니다.

중요한 안전성 정보(계속)

문제는 다른 기관 및 조직에서도 발생할 수 있습니다. 이 문제들은 JEMPERLI로 발생할 수 있는 면역계 문제의 모든 징후와 증상은 아닙니다. 새로운 또는 악화되는 징후나 증상에 대해 즉시 HCP에게 전화하거나 진료를 받으십시오. 징후와 증상은 흉통, 불규칙한 심박동, 숨참, 발목 부종; 혼동, 졸림, 기억력 문제, 기분이나 행동의 변화, 목의 경직, 균형 문제, 팔다리의 저림 또는 마비; 복시, 흐릿한 시야, 빛에 대한 민감성, 눈의 통증, 시력 변화; 지속적인 또는 중증의 근육 통증 또는 쇠약, 근육 경련; 낮은 적혈구, 멍을 포함할 수 있습니다.

문서 전반에 걸쳐 추가 중요 안전성 정보와 투약 지침을 포함한 전체 처방 정보는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

사랑하는 사람의 신체적, 정서적 요구 지원



암 투병 생활은 지칠 수 있습니다. 게다가, 치료로 인한 부작용으로 인해 신체 활동과 일상 생활이 어려워질 수도 있습니다. 사랑하는 사람에게는 다음을 포함한 치료가 필요할 수 있습니다.

- 치료 조정 및 진료 예약. 사랑하는 사람이 약속을 놓치는 경우, 가능한 한 빨리 케어팀과 협력하여 일정을 다시 조정하십시오
- 약물 추적 및 투여
- 물리 치료 돕기
- 목욕, 옷 입기, 화장실 사용 돕기
- 식사 준비
- 청구서 처리 및 보험 관리



일상적인 신체적 관리 외에 정서적 지원을 제공할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

- 환자가 두려움, 불안, 분노 또는 슬픔을 느낄 수 있음을 인식하고 환자가 감정적, 신체적으로 어떻게 느끼는지 케어팀과 이야기하도록 격려하십시오
- 때때로 사랑하는 사람이 자신의 감정을 효과적으로 전달하지 못할 수도 있다는 점을 이해하십시오
- 과거에 표현했던 것보다 더 강한 감정과 느낌에 대비하십시오
- 사랑하는 사람에게 무엇이 필요한지 물어보십시오. 주의를 돌리는 것, 포옹, 혼자 있는 시간 등
- 사랑하는 사람이 자신의 감정에 대해 이야기하도록 격려하고 사랑하는 사람이 말하는 내용을 경청하십시오
- 암 치료 과정에서 감정이 변할 수 있다는 점을 수용하십시오



유용한 팁

사랑하는 사람이 병원 방문 시 당신의 지원이 필요할 수도 있습니다. 질문 목록을 만들어서 미리 준비할 수 있습니다. 질문이 생길 때마다 추가할 수 있도록 휴대전화, 태블릿 또는 노트북에 담아두십시오.

중요한 안전성 정보(계속)

때때로 중증이 되거나 생명을 위협할 수 있는 주입 반응. 주입 반응의 징후와 증상은 오한 또는 떨림, 가려움 또는 발진, 홍조, 숨참 또는 쉼쉼거림, 어지러움, 기절할 것 같은 느낌, 발열, 등 또는 목 통증을 포함할 수 있습니다.

이식 기관 거부. 귀하의 HCP는 귀하가 받은 기관 이식의 유형에 따라 어떤 징후와 증상을 보고하고 모니터링해야 하는지 알려줄 것입니다.

문서 전반에 걸쳐 추가 중요 안전성 정보와 **투약** 지침을 포함한 전체 **처방 정보**는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

케어 파트너: 케어팀의 중요한 멤버

사랑하는 사람의 옹호자가 되는 것은 케어 파트너가 할 수 있는 가장 중요한 역할 중 하나입니다. 사랑하는 사람이 여정 내내 어떤 지원을 받고 싶어하는지 확인하는 것이 좋습니다. 당신이 사랑하는 사람은 이미 많은 생각을 하고 있을 겁니다. 그렇기 때문에 질문을 하는 것이 매우 도움이 되고, 답변을 얻는 것도 중요합니다.

다음은 여러분이 도움을 줄 수 있는 방법입니다.



모든 의료 예약 방문 시

- 진단 및 치료 내역과 업데이트된 약물 목록을 케어팀의 각 구성원과 공유합니다
- 노트를 작성합니다
- 질문 목록을 참조하고 사랑하는 사람이 놓친 질문이 있으면 질문할 준비를 합니다
- 사랑하는 사람을 변호합니다



치료 당일

- 전기 패드나 담요와 같은 편안함을 위한 품목을 챙깁니다
- 환자가 좋아하는 간식을 가져옵니다
- 필요한 경우 질문합니다



부작용이 발생하는 경우

- 증상과 부작용이 발생하면 기록해 둡니다
- 증상이 발생하거나, 변화하거나, 악화되면 케어팀에 연락합니다
- 케어팀의 지시에 따라 특정 증상 관리에 도움을 줍니다
- 자세한 내용은 [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com)에서 JEMPERLI 부작용 가이드를 검토합니다



치료 여정 내내

- 중요한 문서를 함께 보관합니다
- 사랑하는 사람의 치료에 대해 최대한 많이 알아봅니다
- 알려진 전염성 질병이 있는 사람을 피함으로써 사랑하는 사람의 안전을 지키십시오

중요한 안전성 정보(계속)

기증자 줄기세포를 사용하는 골수(줄기세포) 이식(이종 이식)을 받은 사람의 경우 이식편대숙주병 (graft-versus-host-disease, GVHD)을 포함한 합병증. 이러한 합병증은 중대할 수 있으며 사망에 이를 수도 있습니다. 이러한 합병증은 JEMPERLI로 치료하기 전이나 후에 이식을 받은 경우 발생할 수 있습니다. 귀하의 HCP는 이러한 합병증에 대해 귀하를 모니터링할 것입니다.

문서 전반에 걸쳐 추가 중요 안전성 정보와 [투약](#) 지침을 포함한 전체 [처방 정보](#)는 [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com)에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

JEMPERLI는 부작용을 일으킬 수 있습니다

JEMPERLI는 부작용을 일으킬 가능성이 있으며, 그 중 일부는 심각하거나 생명을 위협할 수 있으며 사망으로 이어질 수도 있습니다. JEMPERLI는 면역계가 신체 어느 부위이든 정상 장기와 조직을 공격하게 만들어 그 작용 방식에 영향을 미칠 수 있습니다. 사람마다 다르기 때문에, 사랑하는 사람이 경험할 수 있는 부작용의 유형과 심각성은 사람마다 다릅니다. 이런 문제는 치료 중 언제든지 발생할 수 있고, 치료가 끝난 후에도 발생할 수 있으며, 사랑하는 사람은 이러한 문제 중 두 가지 이상을 동시에 겪을 수도 있습니다.

이 브로셔에 있는 '중요한 안전성 정보'를 주의 깊게 읽어 보시고, 사랑하는 사람이 부작용을 겪는 경우 항상 의료적 조언을 받기 위해 케어팀에 전화하도록 해야 한다는 점을 기억하십시오. 케어팀은 다른 잠재적인 문제 완화 방법을 조언해 줄 수도 있습니다. 의사는 혈액 검사를 통해 부작용이 있는지 확인할 것입니다. 사랑하는 사람에게 심각한 부작용이 나타나는 경우, 담당 의사는 JEMPERLI 치료를 연기하거나 완전히 중단하기로 결정할 수 있습니다.



카보플라틴 및 파클리탁셀과 병용한 JEMPERLI의 가장 흔한 부작용으로는 팔, 손, 다리, 발의 신경 문제; 피로; 오심; 탈모; 관절통; 발진; 변비; 설사; 위 부위(복부) 통증; 숨참; 식욕 감소; 요로 감염; 구토가 있습니다.

단독으로 사용한 JEMPERLI의 가장 흔한 부작용들은 피로 및 쇠약, 낮은 적혈구 수(빈혈), 설사, 오심, 변비, 구토였습니다.

이것이 발생 가능한 모든 JEMPERLI의 부작용은 아닙니다.



유용한 팁

본인이나 사랑하는 사람의 우려가 해결되지 않는다고 생각되면 이를 이야기해도 괜찮습니다. 사실, 귀하의 케어팀이 이를 장려할 가능성이 큼니다.

중요한 안전성 정보(계속)

즉시 치료를 받으면 이러한 문제가 더 중대해지는 것을 막는 데 도움이 될 수 있습니다.

귀하의 HCP는 JEMPERLI 치료 기간 동안 귀하에게 이러한 문제가 있는지 확인할 것이며 코르티코스테로이드나 호르몬 대체 약물을 사용하여 귀하를 치료할 수도 있습니다. 중증 부작용이 나타날 경우, 귀하의 HCP는 JEMPERLI 치료를 지연하거나 완전히 중단해야 할 수도 있습니다.

JEMPERLI를 투여받기 전에, 귀하의 HCP에게 귀하의 모든 의학적 상태에 대해 알려십시오.

여기에는 크론병, 궤양성 대장염 또는 루푸스와 같은 면역계 문제; 기관 이식을 받았는지 여부; 기증자 줄기세포(이종 이식)를 사용하는 줄기세포 이식을 받았는지 여부 또는 그러한 계획; 흉부 부위에 방사선 치료를 받았는지 여부; 중증 근무력증이나 길랑-바레 증후군과 같이 신경계에 영향을 미치는 상태의 존재 여부가 포함됩니다.

문서 전반에 걸쳐 추가 중요 안전성 정보와 **투약** 지침을 포함한 전체 **처방 정보**는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



실제로 JEMPERLI를 투여하는 환자는 아님

자신을 돌보기

케어 파트너가 되는 것은 신체적, 정서적으로 많은 것을 요구하는 큰 책임일 수 있습니다. 자신의 건강과 웰빙에 주의를 기울이면 사랑하는 사람을 최대한 잘 돌볼 수 있습니다.

스트레스를 느끼기 시작하면

당신이 아끼는 사람이 당신에게 의지하고 있을 때, 그 책임이 불안하거나 두렵게 느껴지는 것은 자연스러운 일입니다. 이런 감정은 스트레스로 이어질 수 있습니다. 스트레스의 징후는 사람마다 다를 수 있으므로 기분에 변화가 있으면 담당 의사와 상의하는 것이 중요합니다.

중요한 안전성 정보(계속)

현재 임신 중이거나 임신을 계획하고 있다면 HCP에게 알려십시오. JEMPERLI는 태아에게 해를 끼칠 수 있습니다. 임신이 가능한 경우, 치료를 시작하기 전에 HCP가 임신검사를 실시할 것입니다. 치료 기간 중 및 JEMPERLI 마지막 용량 후 4개월 동안 효과적인 피임법을 사용하십시오. JEMPERLI 치료 중 임신하게 되거나 임신했다고 생각되는 경우 HCP에게 즉시 알려십시오.

현재 모유 수유 중이거나 모유 수유를 계획하고 있다면 HCP에게 알려십시오. JEMPERLI가 모유로 전달되는지 여부는 알려지지 않았습니니다. JEMPERLI 치료 중 및 마지막 용량 후 4개월 동안 모유 수유를 하지 마십시오.

문서 전반에 걸쳐 추가 중요 안전성 정보와 **투약** 지침을 포함한 전체 **처방 정보**는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

자신의 감정은 자연스러운 것이며, 감정에 대해 이야기하는 것이 도움이 될 수 있다는 점을 기억하십시오. 암 케어팀과 솔직하고 개방적으로 대화하십시오. 케어팀은 도움이 될 수 있는 자료를 가지고 있을 수도 있습니다.

만약 당신이 다음과 같이 느낀다면:

지침
좌절함
아이디어 부족
외로움
슬픔
절망
성남
버거움

다음과 같은 사람들에게 도움을 요청하십시오:

- 귀하의 입장에 있는 구성원으로 구성된 케어 파트너 지원 그룹
- 케어팀 사회복지사 또는 정신 건강 자료로 안내해 줄 수 있는 다른 케어팀 구성원

스트레스를 해소하는 건강한 방법

평소보다 높은 수준의 스트레스를 겪고 있다고 생각되면, 무시하지 마십시오. 스트레스를 관리하는 것은 건강에 중요합니다. 스트레스 감소법에 관해 케어팀과 상담해 보십시오. 케어팀은 다음을 시도하라고 제안할 수도 있습니다.

- 일기 쓰기
- 짧은 산책 하기
- 명상하기
- 친구에게 전화하기
- 좋아하는 책 읽기
- 팟캐스트 듣기
- 자신에게 긍정적인 메시지 쓰기
- 10분 요가 세션 하기 (온라인에서 비디오를 찾아보십시오)
- 휴식
- 치료사와 상담
- 지원 그룹에 참여



유용한 팁

소셜 미디어는 케어 파트너 지원 그룹을 찾기에 좋은 곳입니다. 그리고 다른 케어 파트너를 직접 만나는 데 관심이 있다면, 케어팀 멤버에게 지역 지원 그룹에 대한 추천을 요청하십시오.

중요한 안전성 정보(계속)

귀하가 투여하는 모든 약물에 대해 HCP에게 알리십시오. 여기에는 처방약 및 비처방약, 비타민, 생약 보조제 등이 포함됩니다.

카보플라틴 및 파클리탁셀과 병용되는 JEMPERLI의 가장 흔한 부작용으로는 팔, 손, 다리, 발의 신경 문제; 피로; 오심; 탈모; 관절통; 발진; 변비; 설사; 위 부위(복부) 통증; 숨참; 식욕 감소; 요로 감염; 구토가 있습니다.

단독으로 사용되는 JEMPERLI의 가장 흔한 부작용으로는 피로 및 쇠약, 낮은 적혈구 수(빈혈), 설사, 오심, 변비, 구토가 있습니다.

문서 전반에 걸쳐 추가 중요 안전성 정보와 **투약** 지침을 포함한 전체 **처방 정보**는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

나만의 케어팀 만들기

솔직히 말해서 자궁 내막암을 앓고 있는 사랑하는 사람을 돌보면서 직장, 가족 및 기타 책임을 다하는 건 한 사람이 하기에는 너무 힘든 일입니다. 그러니 사람들이 돕고 싶다고 하면 그 제안을 받아들여 주십시오. 다음과 같은 특정 작업을 할당하여 가장 필요한 도움을 받고 있는지 확인하십시오.



- 음식 쇼핑
- 식사 준비
- 사랑하는 사람을 약속 장소까지 운전해 주기
- 아이들을 학교나 활동에 데려가기
- 마당 일하기
- 집 청소
- 눈 치우기
- 어린이, 다른 가족 구성원 또는 애완동물 돌보기

도움을 요청하는 건 언제나 쉬운 일은 아니지만, 배울 수 있는 기술입니다. 그리고 이는 모든 사람에게 다음과 같은 이점을 가져다 줄 수 있습니다.



- 덜 버겁고 더 활력이 넘칠 수 있습니다
- 당신의 사랑하는 사람은 당신에게 부담을 주는 것에 대해 덜 죄책감을 느낄 수 있습니다
- 도움을 주는 사람들은 기여할 수 있다는 사실에 기분이 좋습니다

온라인 리소스

사랑하는 사람을 위한 교육 자료는 JEMPERLI.com에서 확인하실 수 있습니다. 케어 파트너를 위한 온라인 리소스를 다음 위치에서 탐색하십시오.

미국암협회
CancerCare
SHARE 암 지원

cancer.org
cancercare.org
sharecancersupport.org

참고: 이러한 리소스는 GSK의 외부 리소스입니다. GSK는 이러한 리소스를 통해 제공되는 콘텐츠나 정보를 통제할 수 없으므로, 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다. 미국암협회를 포함한 이러한 조직은 어떤 제품이나 서비스도 추천하지 않습니다.

중요한 안전성 정보(계속)

이것이 발생 가능한 모든 JEMPERLI의 부작용은 아닙니다. 부작용에 대한 의학적 조언을 받으려면 의사에게 연락하십시오.

처방약의 부작용은 1-800-FDA-1088번으로 전화하거나 www.fda.gov/medwatch를 방문하여 FDA에 보고할 것을 권장합니다.

투약 지침을 포함하는 전체 처방 정보는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

상표는 해당 소유자의 재산입니다.

GSK ©2024 GSK or licensor.
PMUS-DSTBROC240052 December 2024
Produced in USA.

파일 이름: Korean Care Partner Guide

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg