



No es una paciente real que toma JEMPERLI.

Apoyo a su ser querido a lo largo de su proceso de tratamiento*

*Esta información no sustituye los consejos de un proveedor de atención médica. El equipo de atención de su ser querido es la mejor fuente para responder las preguntas relacionadas con su plan de tratamiento.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com).

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



Tabla de contenido

Cómo hacer frente a una nueva etapa.....4

¿Qué se espera de una persona de apoyo?.....6

La persona de apoyo: un miembro clave del equipo de atención.....8

Cuidado personal.....10

Formación de su propio equipo de atención.....12

Usos aprobados

JEMPERLI es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultas que tienen:

- un tipo de cáncer uterino llamado cáncer de endometrio (CE)
 - JEMPERLI puede utilizarse en combinación con los medicamentos quimioterapéuticos carboplatino y paclitaxel y, posteriormente, JEMPERLI puede utilizarse solo:
 - cuando el cáncer se ha extendido fuera del útero (avanzado) ◦
 - el cáncer ha regresado.
 - JEMPERLI puede utilizarse solo:
 - cuando una prueba de laboratorio indique que el tumor es deficiente en la reparación de los errores de emparejamiento (dMMR, mismatch repair deficient) y
 - el cáncer ha regresado o se ha propagado (CE avanzado) y
 - cuando ha recibido quimioterapia con platino, y no ha funcionado o ya no funciona y
 - el cáncer no se puede tratar con cirugía ni radiación.

Se desconoce si JEMPERLI es seguro y eficaz en niños.

Información Importante de Seguridad

JEMPERLI es un medicamento que actúa sobre el sistema inmunitario para tratar determinados tipos de cáncer. JEMPERLI puede hacer que su sistema inmunitario ataque los órganos y tejidos normales en cualquier lugar del organismo y puede afectar la forma en que funcionan. En ocasiones, estos problemas pueden resultar graves o poner en peligro la vida y provocar la muerte. Usted puede tener más de uno de estos problemas al mismo tiempo. Estos problemas pueden presentarse en cualquier momento durante el tratamiento o incluso después de haberlo finalizado.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg



No es una paciente real que toma JEMPERLI.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Llame o consulte a su proveedor de atención médica (HCP, Healthcare Provider) de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o empeoran los existentes, incluidos los siguientes:

Problemas pulmonares. Los signos y síntomas pueden incluir tos, falta de aliento o dolor en el pecho.

Problemas intestinales. Los signos y síntomas pueden incluir diarrea o más deposiciones que de costumbre; heces negras, alquitranadas, pegajosas o con sangre o mucosidad; o sensibilidad o dolor intenso en el área del estómago (abdomen).

Problemas hepáticos. Los signos y síntomas pueden incluir piel o parte blanca de los ojos amarillentas, náuseas o vómitos intensos, dolor en el lado derecho del área del estómago (abdomen), orina oscura (como el té) o sangrado o moretones que ocurren con mayor facilidad de lo habitual.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg

Cómo hacer frente a una nueva etapa

Cuando a un ser querido le diagnostican cáncer de endometrio, la vida puede dar un giro inesperado. Este desafío inesperado puede generar una montaña rusa de emociones, desde la preocupación hasta el alivio, y desde la desesperación hasta la esperanza. Esto es completamente normal. La buena noticia es que no está solo; muchas otras personas de apoyo experimentan sentimientos similares.

Como persona de apoyo, puede influir significativamente en el bienestar general de su ser querido. Para hacer más llevadero el camino que tiene por delante, infórmese sobre lo que puede esperar y busque apoyo en esta guía.

Introducción al cáncer de endometrio

Cáncer de endometrio: cáncer que comienza en el tejido que recubre el útero. Los síntomas frecuentes pueden incluir sangrado vaginal anormal y dolor en la pelvis.



Se diagnostican unos 61,000 casos
al año en EE. UU.

Avanzado o recidivante: cáncer de endometrio que se ha extendido fuera del útero o que regresa después del tratamiento. Los síntomas frecuentes pueden ser sangrado vaginal, disminución del apetito, pérdida de peso inexplicable o dolor en la pelvis, las caderas, el estómago o la espalda.



Afecta aproximadamente a 1 de cada 4
personas con cáncer de endometrio

Riesgo familiar de cáncer de endometrio

El cáncer de endometrio tiende a ser hereditario en algunas familias. Algunas personas también pueden tener una enfermedad genética hereditaria llamada **síndrome de Lynch**, que aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. Si su madre u otra persona de su familia ha tenido cáncer de endometrio, es importante que se informe sobre los signos y síntomas de esta enfermedad. Consulte con su médico si sería recomendable realizar pruebas genéticas.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Llame o consulte a su proveedor de atención médica (HCP, Healthcare Provider) de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o empeoran los existentes, incluidos los siguientes (continuación):

Problemas con las glándulas hormonales. Los signos y síntomas pueden incluir dolor de cabeza inusual o que no desaparece, sensibilidad ocular a la luz, problemas oculares, latidos cardíacos rápidos, aumento de la sudoración, cansancio extremo, aumento o pérdida de peso, más hambre o sed de lo habitual, orinar con más frecuencia de la habitual, caída de cabello, sensación de frío, estreñimiento, voz más grave, mareo o desmayo, cambios de humor o comportamiento como disminución del deseo sexual, irritabilidad o tendencia al olvido.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg

Conozca al equipo de atención oncológica

El tratamiento del cáncer de endometrio puede ser complejo. Por ello, su ser querido estará en manos de un equipo de especialistas, cada uno con conocimientos y habilidades específicos. Esto puede incluir lo siguiente:

Supervisión de la atención y del tratamiento

- Oncólogo médico
- Ginecólogo oncólogo
- Cirujano oncológico
- Asistente médico (PA, Physician Assistant) oncológico

Gestión de atención adicional

- Asesor de pacientes
- Equipo de cuidados paliativos
- Trabajador social clínico
- Profesional de salud mental

Atención diaria

- Personal de enfermería especializado (NP, Nurse Practitioner) en oncología
- Personal de enfermería de Oncología
- Administrador de casos
- Personal de enfermería que realiza la infusión

Otros miembros del equipo

- Dietista/nutricionista
- Radiólogo
- Terapeuta de rehabilitación
- Farmacéutico clínico oncológico



Recomendación práctica

Averigüe quién será su contacto principal para consultas generales y qué debe hacer en caso de emergencia.

Información Importante de Seguridad (continuación)


Llame o consulte a su proveedor de atención médica (HCP, Healthcare Provider) de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o empeoran los existentes, incluidos los siguientes (continuación):

Problemas renales. Los signos y síntomas pueden incluir cambios en la cantidad o el color de la orina, sangre en la orina, hinchazón de tobillos o pérdida de apetito.

Problemas cutáneos. Los signos y síntomas pueden incluir erupción, picazón, formación de ampollas o descamación de la piel, inflamación de los ganglios linfáticos, llagas o úlceras dolorosas en la boca, la nariz, la garganta o la zona genital; fiebre o síntomas de tipo gripal.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg



No es una paciente real que toma JEMPERLI.

¿Qué se espera de una persona de apoyo?

Cada proceso oncológico es único, y las necesidades de cada paciente varían a lo largo del camino. Como persona de apoyo, es probable que dedique gran parte de su tiempo a ayudar con las necesidades físicas de su ser querido. Además, dado que el diagnóstico de cáncer de endometrio suele generar emociones como tristeza, ira o preocupación, es posible que su ser querido también necesite apoyo emocional adicional de usted y de su equipo de atención médica.

Información Importante de Seguridad (continuación)

También pueden producirse problemas en otros órganos y tejidos. Estos no son todos los signos y síntomas de problemas del sistema inmunitario que pueden aparecer con JEMPERLI. Llame o consulte a su HCP de inmediato si aparece algún signo o síntoma nuevo o que empeore. Los signos y síntomas pueden incluir dolor en el pecho, latidos cardíacos irregulares, dificultad respiratoria, hinchazón de tobillos, confusión, tendencia al sueño, problemas de memoria, cambios de humor o comportamiento, cuello rígido, problemas de equilibrio, sensación de hormigueo o entumecimiento de brazos o piernas, visión doble, visión borrosa, sensibilidad a la luz, dolor de los ojos, cambios en la visión, dolor o debilidad muscular constantes o intensos, calambres musculares, recuento bajo de glóbulos rojos, moretones.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg

Apoyo a las necesidades físicas y emocionales de su ser querido



Vivir con cáncer puede ser agotador, y los efectos secundarios del tratamiento pueden dificultar tanto las actividades físicas como las tareas cotidianas. Su ser querido podría necesitar asistencia en áreas como:

- Coordinar la atención y programar citas médicas. Si falta a alguna cita, colabore con el equipo de atención para reprogramarla lo antes posible.
- Llevar un control de los medicamentos y administrarlos.
- Ayudar con la fisioterapia.
- Prestar ayuda para actividades como bañarse, vestirse e ir al baño.
- Preparar las comidas.
- Gestionar facturas y seguros.



Además de ofrecer cuidados físicos diarios, también puede brindar apoyo emocional de la siguiente manera:

- Reconozca que su ser querido puede experimentar miedo, ansiedad, ira o tristeza. Fomente el diálogo sobre sus sentimientos y anímela a hablar tanto con usted como con su equipo de atención sobre su estado emocional y físico.
- Prepárese para emociones y sentimientos más intensos de los que su ser querido haya expresado en el pasado.
- Anime a su ser querido a compartir lo que siente y escuche atentamente sus palabras.
- Comprenda que, en ocasiones, puede resultar difícil para su ser querido comunicar sus emociones de manera eficaz.
- Pregúntele qué necesita en esos momentos, ya sea una distracción, un abrazo o un tiempo a solas.
- Tenga en cuenta que las emociones pueden cambiar a lo largo del proceso del cáncer.



Recomendación práctica

Es posible que su ser querido necesite su apoyo durante las consultas médicas. Puede prepararse de antemano elaborando una lista de preguntas. Mantenga esta lista a mano en su teléfono, tableta o cuaderno, y añada nuevas preguntas a medida que surjan.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Reacciones a la infusión que, a veces, pueden ser graves o potencialmente mortales.

Los signos y síntomas de reacciones a la infusión pueden incluir escalofríos o temblores, picazón o erupción, rubefacción, falta de aliento o sibilancia, mareo, sensación de desmayo, fiebre, dolor de espalda o cuello.

Rechazo de un órgano trasplantado. Su HCP debe indicarle qué signos y síntomas debe notificar, y deberá vigilarla, según el tipo de trasplante de órgano que haya recibido.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg

La persona de apoyo: un miembro clave del equipo de atención

Actuar como defensor de su ser querido es una de las funciones más cruciales que puede desempeñar. Pregúntele cómo le gustaría recibir apoyo a lo largo de su proceso. Dado que su ser querido probablemente estará lidiando con muchas preocupaciones, es fundamental que usted formule preguntas y se asegure de obtener las respuestas que necesita.

Así es como puede ayudar



En todas las citas médicas

- Comparta el diagnóstico y el historial de tratamiento de su ser querido, así como una lista actualizada de los medicamentos, con cada uno de los miembros del equipo de atención.
- Tome notas.
- Revise su lista de preguntas y esté preparado para formular aquellas que su ser querido pueda haber pasado por alto.
- Actúe como defensor de su ser querido.



Días de tratamiento

- Lleve artículos de confort, como una almohadilla térmica o una manta.
- Lleve su bocadillo favorito.
- No dude en hacer preguntas cuando sea necesario.



Si se presentan efectos secundarios

- Anote los síntomas y efectos secundarios a medida que se presenten.
- Comuníquese con el equipo de atención si se presentan síntomas, si estos cambian o si empeoran.
- Ayude a controlar algunos síntomas siguiendo las indicaciones del equipo de atención.
- Revise la Guía de efectos secundarios de JEMPERLI para obtener más información en [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com)



A lo largo del proceso de tratamiento

- Mantenga todos los documentos importantes en un solo lugar.
- Infórmese lo más posible sobre el tratamiento de su ser querido.
- Proteja a su ser querido evitando el contacto con personas que tengan enfermedades contagiosas conocidas.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Complicaciones, incluida la enfermedad del injerto contra el huésped (EICH), en personas que han recibido un trasplante de médula ósea (células madre) en el que se utilizan células madre de un donante (allogénico). Estas complicaciones pueden ser graves y causar la muerte. Estas complicaciones se pueden producir si se sometió a un trasplante antes o después de recibir tratamiento con JEMPERLI. Su HCP la controlará para detectar estas complicaciones.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com).

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg

JEMPERLI puede causar efectos secundarios

JEMPERLI puede provocar efectos secundarios, algunos de los cuales pueden ser graves o incluso potencialmente mortales. JEMPERLI puede hacer que su sistema inmunitario ataque los órganos y tejidos normales en cualquier lugar del organismo. Esto puede afectar la forma en que funcionan. Cada persona es única, por lo que el tipo y la gravedad de los efectos secundarios que experimentará su ser querido serán distintos para ella. Estos efectos pueden aparecer en cualquier momento durante el tratamiento, e incluso después de haberlo finalizado, y es posible que su ser querido enfrente varios de estos problemas simultáneamente.

Lea detenidamente la Información importante de seguridad a lo largo de este folleto y recuerde que su ser querido debe comunicarse siempre con su equipo de atención para recibir orientación médica sobre cualquier efecto secundario que experimente. El equipo de atención podrá recomendar otros métodos de alivio. Además, su médico realizará análisis de sangre para evaluar los efectos secundarios. Si su ser querido presenta efectos secundarios graves, el médico podría optar por retrasar o interrumpir completamente el tratamiento con JEMPERLI.



Los efectos secundarios más frecuentes de JEMPERLI cuando se administra con carboplatino y paclitaxel incluyen problemas nerviosos en los brazos, las manos, las piernas y los pies; cansancio; náuseas; caída del cabello; dolor articular; erupción; estreñimiento; diarrea; dolor en el área del estómago (abdomen); falta de aliento; disminución del apetito; infecciones de las vías urinarias; vómitos.

Los efectos secundarios más frecuentes de JEMPERLI cuando se usa solo son cansancio y debilidad, recuento bajo de glóbulos rojos (anemia), diarrea, náuseas, estreñimiento y vómitos.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de JEMPERLI.



Recomendación práctica

Expresar sus preocupaciones no solo es válido, sino que es importante si siente que no están siendo consideradas; de hecho, es probable que el equipo de atención lo fomente.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Recibir tratamiento médico de inmediato podría evitar que estos problemas se agraven.

Su HCP la examinará para detectar estos problemas durante el tratamiento con JEMPERLI y podrá administrarle corticosteroides o medicamentos de reemplazo hormonal. Si tiene efectos secundarios graves, es posible que su HCP también deba retrasar o suspender de forma definitiva el tratamiento con JEMPERLI.

Antes de recibir JEMPERLI, informe a su HCP sobre todas sus afecciones médicas, como, por ejemplo, problemas del sistema inmunitario, como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o lupus; ha recibido un trasplante de órgano; ha recibido o tiene previsto recibir un trasplante de células madre en el que se utilicen células madre de un donante (allogénico); ha recibido radioterapia en la zona torácica; padece alguna enfermedad que afecte al sistema nervioso, como miastenia grave o síndrome de Guillain-Barré.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg



No es una paciente real que toma JEMPERLI.

Cuidado personal

Ser una persona de apoyo implica una gran responsabilidad que demanda un considerable esfuerzo de su parte, tanto a nivel físico como emocional. Cuidar de su propia salud y bienestar es fundamental para poder ofrecer el mejor apoyo posible a su ser querido.

Si comienza a sentirse estresado

Es natural experimentar ansiedad o temor ante la responsabilidad que implica cuidar de alguien a quien aprecia, y estos sentimientos pueden generar estrés. Los signos de estrés pueden variar de una persona a otra, por lo que es importante que informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier cambio en su estado emocional.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Si está embarazada o planea quedar embarazada, infórmelo a su HCP. JEMPERLI puede dañar al feto. Si puede quedar embarazada, su HCP le realizará una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento. Utilice un método anticonceptivo eficaz durante su tratamiento y durante los 4 meses siguientes a la última dosis de JEMPERLI. Si queda embarazada durante su tratamiento con JEMPERLI o si cree que podría estar embarazada, infórmelo de inmediato a su HCP.

Si está amamantando o planea amamantar, infórmelo a su HCP. Se desconoce si JEMPERLI pasa a través de la leche materna. No amamante durante el tratamiento con JEMPERLI y durante los 4 meses posteriores a su última dosis.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg

Recuerde que sus sentimientos son completamente normales y hablar sobre ellos puede ser de gran ayuda. Sea abierto y honesto con su equipo de atención oncológica, ya que podrían tener recursos disponibles que le brinden apoyo.

Si se siente:

Agotado
Frustrado
Desorientado
Solo
Triste
Desesperanzado
Enojado
Agobiado

Pida ayuda a:

- Grupos de ayuda para personas de apoyo, cuyos miembros han vivido situaciones similares a la suya.
- El trabajador social de su equipo de atención y otros miembros pueden orientarlo para acceder a recursos de salud mental.

Formas saludables de aliviar el estrés

Si siente que está experimentando un nivel de estrés superior al habitual, no lo ignore. Es fundamental manejar el estrés para cuidar su salud. Converse con su equipo de atención sobre estrategias para reducir el estrés; pueden sugerirle que intente:

- Llevar un diario.
- Dar un paseo a pie.
- Meditar.
- Llamar a un amigo.
- Leer un libro que le guste.
- Escuchar un podcast.
- Escribir mensajes positivos para usted mismo.
- Realizar una sesión de yoga de 10 minutos (busque videos en línea).
- Descansar.
- Hablar con un terapeuta.
- Participar en un grupo de apoyo.



Recomendación práctica

Las redes sociales son una excelente manera de encontrar grupos de apoyo para personas de apoyo. Si le interesa conectarse con otras personas de apoyo de forma presencial, solicite a un miembro de su equipo que le recomiende grupos de apoyo locales.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Infórmele a su HCP sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

Los efectos secundarios más frecuentes de JEMPERLI cuando se administra con carboplatino y paclitaxel incluyen problemas nerviosos en los brazos, las manos, las piernas y los pies; cansancio; náuseas; caída del cabello; dolor articular; erupción; estreñimiento; diarrea; dolor en el área del estómago (abdomen); falta de aliento; disminución del apetito; infecciones de las vías urinarias; vómitos.

Los efectos secundarios más frecuentes de JEMPERLI cuando se usa solo son cansancio y debilidad, recuento bajo de glóbulos rojos (anemia), diarrea, náuseas, estreñimiento y vómitos.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg

Formación de su propio equipo de atención

Seamos realistas: cuidar de un ser querido con cáncer de endometrio, al mismo tiempo que se atienden responsabilidades laborales, familiares y de otro tipo, puede ser una carga abrumadora para una sola persona. Por eso, cuando alguien ofrezca su ayuda, ¡no dude en aceptarla! Asegúrese de obtener el apoyo que realmente necesita asignando tareas específicas. Por ejemplo:



- Comprar alimentos.
- Preparar las comidas.
- Llevar a su ser querido a las citas.
- Llevar a los niños a la escuela o a actividades.
- Hacer tareas de jardinería.
- Limpiar la casa.
- Quitar la nieve.
- Cuidar a los niños, otros familiares o mascotas.

Pedir ayuda no siempre es sencillo, pero es una habilidad que se puede aprender y que puede resultar beneficiosa para todos:



- Puede sentirse menos abrumado y con más energía.
- Su ser querido puede sentirse menos culpable por ser una carga para usted.
- Sus ayudantes se sentirán satisfechos al poder contribuir.

Recursos en línea

En [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com) encontrará recursos educativos para su ser querido. Explore también los recursos en línea dirigidos a personas de apoyo en:

American Cancer Society
CancerCare
SHARE Cancer Support

cancer.org
cancercare.org
sharecancersupport.org

Tenga en cuenta lo siguiente: Estos recursos son externos a GSK. GSK no tiene control sobre el contenido o la información proporcionada a través de estos recursos y, por lo tanto, no garantiza su exactitud o integridad. Estas organizaciones, incluida la American Cancer Society, no respaldan ningún producto o servicio.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de JEMPERLI. Comuníquese con su médico para recibir asesoramiento sobre los efectos secundarios.

Se recomienda notificar los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Para ello, llame al 1-800-FDA-1088 o visite www.fda.gov/medwatch.

Consulte la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com).

Las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



©2024 GSK or licensor.
PMUS-DSTBROC240048 December 2024
Produced in USA.

Nombre del archivo: Spanish Care Partner Guide

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg