



실제로 JEMPERLI를 투여하는 환자는 아님.

진료팀, 사랑하는 이들을 포함한 다른 사람들과 **JEMPERLI** 치료 여정에 대해 이야기하는 방법

전반적인 중요 안전성 정보와 [투약 지침](#)을 포함한 전체
[처방 정보](#)는 [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com)에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



실제로 JEMPERLI를 투여하는 환자는 아님.

승인된 용도

JEMPERLI는 성인에서 다음과 같은 질환을 치료하는 데 사용되는 처방약입니다:

- 자궁내막암(endometrial cancer, EC)이라 불리는 자궁암의 한 유형
 - JEMPERLI는 화학요법 약물인 카보플라틴 및 파클리탁셀과 함께 사용할 수 있고, 이후 다음의 경우에 JEMPERLI를 단독으로 사용할 수 있습니다.
 - 암이 자궁 밖으로 퍼진 경우(진행성) 또는,
 - 이 재발한 경우.
 - JEMPERLI는 다음의 경우 단독으로 사용할 수 있습니다.
 - 실험실 검사에서 종양이 불일치 복구 결핍(mismatch repair deficient, dMMR)인 것으로 나타나는 경우, 그리고
 - 암이 재발했거나 퍼진 경우(진행성 EC), 그리고
 - 귀하가 백금 함유 화학요법을 받았으며 이 요법이 효과가 없었거나 더 이상 효과가 없는 경우, 그리고
 - 귀하의 암이 수술이나 방사선으로 치료할 수 없는 경우.

JEMPERLI가 소아에서 안전하고 효과적인지 여부는 알려지지 않았습니다.

중요한 안전성 정보

JEMPERLI는 면역계와 함께 작용하여 특정 암을 치료할 수 있는 약물입니다. JEMPERLI는 면역계가 신체 어느 부위이든 정상 장기와 조직을 공격하게 만들어 그 작용 방식에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 문제는 때로 중증이 되거나 생명을 위협할 수 있으며, 사망에 이를 수도 있습니다. 이러한 문제는 여러 가지가 동시에 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 치료 중 언제든지 발생할 수 있으며, 치료가 끝난 후에도 발생할 수 있습니다.

전반적인 추가 중요 안전성 정보와 [투약 지침](#)을 포함한 전체 [처방 정보](#)는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

진료팀과 유익한 상담 시작하기

더 잘 준비된 기분으로 질문하기 위해 미리 계획을 세우는 것이 좋습니다.

진료 전:



잠시 시간을 내어 방문 중에 의사에게 묻고 싶은 질문을 생각해 보세요. 예를 들어:

- 현재 나는 나의 치료 여정의 어디쯤 있나요?
- 생체표지자 검사란 무엇인가요?
 - 생체표지자 검사 결과는 어떤 종류의 정보를 제공합니까?



이 상담 가이드의 4~5페이지를 인쇄하고 펜이나 원하는 필기 방법을 가져가세요.



가능하다면 사랑하는 사람을 초대해 보세요.

- 귀하에게 지원이 필요할 수 있으며, 귀하가 의사가 말하는 것을 듣고 이해하도록 도와줄 다른 사람을 동반하는 것이 좋을 수 있습니다

중요한 안전성 정보(계속)

다음에 포함하여 새로운 징후나 증상이 발생하거나 징후나 증상이나 악화되는 경우 즉시 의료서비스 제공자(healthcare provider, HCP)에게 전화하거나 진료를 받으십시오:

폐 문제. 징후와 증상은 기침, 숨참, 흉통을 포함할 수 있습니다.

장 문제. 징후와 증상은 설사 또는 평소보다 더 잦은 배변; 검고 타르 같은 끈적한 변 또는 혈액이나 점액이 있는 변; 중증의 위장 부위(복부) 통증 또는 압통을 포함할 수 있습니다.

전반적인 추가 중요 안전성 정보와 [투약 지침](#)을 포함한 전체 [처방 정보](#)는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

진료 중:



귀하의 진료팀은 언제든지 귀하의 치료에 관한 질문에 답변해 드릴 수 있습니다. 아래의 상담 주제는 대화를 시작할 때 더 자신감을 갖는 데 도움이 될 수 있습니다.

시작하기

왜 JEMPERLI가 나의 치료 옵션으로 선택되었나요? _____

JEMPERLI가 나에게 효과적인지 어떻게 알 수 있나요? 내가 가진 자궁내막암 유형에 대해 JEMPERLI를 어떻게 연구했습니까? _____

JEMPERLI 환자를 위한 지원 프로그램에 어떻게 연결할 수 있나요? _____

자궁내막암을 앓고 있는 다른 사람들과 어디에서 소통할 수 있나요? _____

치료 받기

JEMPERLI는 어떻게 제공되나요? _____

주입을 위해 무엇을 준비해야 하나요? _____

각 주입은 얼마나 걸리나요? _____

얼마나 오랫동안 치료를 받나요? _____

중요한 안전성 정보(계속)

다음에 포함하여 새로운 징후 또는 증상이 발생하거나 징후 또는 증상이 악화되는 경우 즉시 의료 서비스 공급자(healthcare provider, HCP)에게 전화하거나 진료를 받으십시오(계속):

간 문제. 징후와 증상은 피부 또는 눈의 흰자가 노랗게 변함, 중증 오심 또는 구토, 오른쪽 위 부위(복부) 통증, 진한색 소변(차색), 또는 평소보다 쉽게 출혈이나 멍이 생김 등을 포함할 수 있습니다.

전반적인 추가 중요 안전성 정보와 [투약 지침](#)을 포함한 전체 [처방 정보](#)는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

치료 받기(계속)

치료에 효과가 있는지 어떻게 알 수 있나요? _____

귀하가 느낄 수 있는 상태

치료 중에 어떤 부작용을 경험할 수 있나요? _____

부작용은 어떻게 모니터링되나요? _____

부작용이 있다고 생각될 때 진료팀에 연락하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?


부작용에 대해 주의하고 발생할 경우 진료팀과 상의하세요.



JEMPERLI의 부작용에 대해 더 자세히 알고 싶으신가요?

JEMPERLI.com을 방문하십시오

진료 후:



진료를 마친 후에도 여전히 궁금한 점이 있거나 새로운 질문이 떠오르는 경우가 많습니다. 궁금한 점이 있으면 언제든지 진료팀에 문의하거나 후속 방문 일정을 예약하세요.

중요한 안전성 정보(계속)

다음에 포함하여 새로운 징후 또는 증상이 발생하거나 징후 또는 증상이 악화되는 경우 즉시 의료 서비스 공급자(healthcare provider, HCP)에게 전화하거나 진료를 받으십시오(계속):

호르몬 분비선 문제. 징후와 증상은 사라지지 않는 두통 또는 비정상적인 두통, 빛에 대한 눈 민감성, 눈 문제, 빠른 심박동, 발한 증가, 극심한 피로, 체중 증가 또는 감소, 평소보다 더 배고픔 또는 갈증을 느낌, 평소보다 더 잦은 배뇨, 탈모, 추운 느낌, 변비, 목소리가 더 굵어짐, 어지러움 또는 실신, 성욕 감소, 예민함 또는 건망증과 같은 기분이나 행동의 변화를 포함할 수 있습니다.

전반적인 추가 중요 안전성 정보와 [투약 지침](#)을 포함한 전체 [처방 정보](#)는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

사랑하는 사람들과 경험을 공유하세요



암은 가족 전체에 영향을 미칩니다. 하지만 귀하가 사랑하는 사람들은 무슨 말을 해야 할지, 무엇을 해야 할지 모를 수도 있습니다. **원한다면 대화를 주도하여 상대방이 어떻게 지원할 수 있는지 이해하도록 도와주는 것이 좋습니다.**

치료에 관해 어떻게 이야기할지 결정하세요.

- 가족과 직접 대화하고, 일기에 최신 정보를 제공하거나, 웰컴 키트에 있는 진료 파트너 가이드와 같은 리소스를 가족에게 안내하여 질문에 답변하는 것을 고려하세요

귀하가 신뢰하는 사람들에게 의지하세요.

- 당신의 삶 속의 사람들은 진심으로 당신을 돕고 싶어합니다. 필요할 때 지원을 받는 것에 대해 나쁘게 생각할 필요는 없습니다
- 사람들이 "무엇을 도와줄까요?"라고 물었을 때 구체적인 답변을 하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 요리, 빨래, 장보기 또는 주입 센터까지 태워다 주는 데 도움이 필요하신가요?

시간을 내어 사랑하는 사람들을 만나거나, 좋아하는 일을 하세요.

- 치료 여정 전반적으로 자신에게 가장 중요한 것을 유지하는 것이 중요합니다. 지원 그룹에 속해 있다면 다른 사람들이 암을 이겨내는 데 보람을 느끼거나 즐거워하는 취미를 시도해 볼 수도 있습니다

가족들에게 기분이 어떤지 물어보세요.

- 이런 방식으로 대화를 전환하면 가족이 감정을 충분히 표현할 수 있는 공간을 확보할 수 있습니다

중요한 안전성 정보(계속)


다음에 포함하여 새로운 징후 또는 증상이 발생하거나 징후 또는 증상이 악화되는 경우 즉시 의료 서비스 공급자(healthcare provider, HCP)에게 전화하거나 진료를 받으십시오(계속):

신장 문제. 징후와 증상은 소변의 양이나 색의 변화, 소변 내 혈액, 발목 부종 또는 식욕 상실을 포함할 수 있습니다.

피부 문제. 징후와 증상은 발진; 가려움; 피부 물집 또는 벗겨짐; 림프절 부종; 구강 또는 코, 인후 또는 생식기 부위의 통증성 상처 또는 궤양; 발열 또는 독감 유사 증상을 포함할 수 있습니다.

전반적인 추가 중요 안전성 정보와 [투약 지침](#)을 포함한 전체 [처방 정보](#)는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



실제로 JEMPERLI를 투여하는 환자는 아님.

중요한 안전성 정보(계속)

문제는 다른 기관 및 조직에서도 발생할 수 있습니다. 이 문제들은 **JEMPERLI**로 발생할 수 있는 면역계 문제의 모든 징후와 증상은 아닙니다. 새로운 또는 악화되는 징후나 증상에 대해 즉시 **HCP**에게 전화하거나 진료를 받으십시오. 징후와 증상은 흉통, 불규칙한 심박동, 숨참, 발목 부종; 혼동, 졸림, 기억력 문제, 기분이나 행동의 변화, 목의 경직, 균형 문제, 팔다리의 저림 또는 마비; 복시, 흐릿한 시야, 빛에 대한 민감성, 눈의 통증, 시력 변화; 지속적인 또는 중증의 근육 통증 또는 쇠약, 근육 경련; 낮은 적혈구, 명을 포함할 수 있습니다.

때때로 중증이 되거나 생명을 위협할 수 있는 주입 반응. 주입 반응의 징후와 증상은 오한 또는 떨림, 가려움 또는 발진, 홍조, 숨참 또는 쉼썩거림, 어지러움, 기절할 것 같은 느낌, 발열, 등 또는 목 통증을 포함할 수 있습니다.

이식 기관 거부. 귀하의 HCP는 귀하가 받은 기관 이식의 유형에 따라 어떤 징후와 증상을 보고하고 모니터링해야 하는지 알려줄 것입니다.

전반적인 추가 중요 안전성 정보와 [투약 지침](#)을 포함한 전체 [처방 정보](#)는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

암에 대해 이야기하기

암에 대해 이야기를 하다 보면 다양한 감정을 느낄 수 있습니다. 하지만, 소식을 공유함으로써 귀하가 자신의 경험을 더 잘 조절하고 있다고 느끼는 데 도움이 될 수 있습니다. 가장 가까운 친구와 가족부터 동료와 지역 사회에 이르기까지 이 정보를 공유하고 싶은 사람과 그 사람에게 정보를 어떻게 전달할 것인지에 대해 생각해 보는 것이 중요합니다.

- 귀하의 경험을 어떻게 공유할 것인지는 귀하에게 달려 있습니다. 또는 귀하가 경험을 전혀 공유하고 싶어하는지 여부도 귀하에게 달려 있습니다
 - 귀하의 경험에 대해 이야기하고 싶다면 먼저 이야기하고 싶은 사람들의 목록을 만들고 첫 대화에서 얼마나 많은 것을 공유하고 싶은지 생각해 보세요
- 직접 대화하고 싶다면 가장 편안하고 조용한 환경을 선택하는 것을 고려하세요
 - 주제를 천천히 소개해 보세요. 어려움이 있다면 "아시다시피, 요즘 몸이 좋지 않아요"와 같이 말하면서 시작할 수 있습니다
- 또한 전화나 편지로 소식을 공유하는 것도 편안하다면 고려할 수 있습니다
- 때로는 아직 잘 모르는 사람과 대화하는 것이 더 쉬울 수 있습니다
 - 지원 그룹에 가입하거나 온라인 커뮤니티를 찾아 귀하가 경험 중인 일에 대해 알고 있는 다른 사람들과 익명으로 대화하는 것을 고려하세요



자궁내막암 치료 여정에서 무엇을 예상할 수 있는지 자세히 알아보고 싶으신가요?

JEMPERLI.com을 방문하십시오

중요한 안전성 정보(계속)

기증자 줄기세포를 사용하는 골수(줄기세포) 이식(이종 이식)을 받은 사람의 경우 이식편대숙주병(**graft-versus-host-disease, GVHD**)을 포함한 합병증. 이러한 합병증은 중대할 수 있으며 사망에 이를 수도 있습니다. 이러한 합병증은 JEMPERLI로 치료하기 전이나 후에 이식을 받은 경우 발생할 수 있습니다. 귀하의 HCP는 이러한 합병증에 대해 귀하를 모니터링할 것입니다.

즉시 치료를 받으면 이러한 문제가 더 중대해지는 것을 막는 데 도움이 될 수 있습니다.

귀하의 HCP는 JEMPERLI 치료 기간 동안 귀하에게 이러한 문제가 있는지 확인할 것이며 코르티코스테로이드나 호르몬 대체 약물을 사용하여 귀하를 치료할 수도 있습니다. 중증 부작용이 나타날 경우, 귀하의 HCP는 JEMPERLI 치료를 지연하거나 완전히 중단해야 할 수도 있습니다.

전반적인 추가 중요 안전성 정보와 [투약 지침](#)을 포함한 전체 [처방 정보](#)는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



실제로 JEMPERLI를 투여하는 환자는 아님.

중요한 안전성 정보(계속)

JEMPERLI를 투여받기 전에, 귀하의 HCP에게 귀하의 모든 의학적 상태에 대해 알려십시오.

여기에는 크론병, 궤양성 대장염 또는 루푸스와 같은 면역계 문제; 기관 이식을 받았는지 여부; 기증자 줄기세포(이중 이식)를 사용하는 줄기세포 이식을 받았는지 여부 또는 그러한 계획; 흉부 부위에 방사선 치료를 받았는지 여부; 중증 근무력증이나 길랑-바레 증후군과 같이 신경계에 영향을 미치는 상태의 존재 여부가 포함됩니다.

현재 임신 중이거나 임신을 계획하고 있다면 HCP에게 알려십시오. JEMPERLI는 태아에게 해를 끼칠 수 있습니다. 임신이 가능한 경우, 치료를 시작하기 전에 HCP가 임신검사를 실시할 것입니다. 치료 기간 중 및 JEMPERLI 마지막 용량 후 4개월 동안 효과적인 피임법을 사용하십시오. JEMPERLI 치료 중 임신하게 되거나 임신했다고 생각되는 경우 HCP에게 즉시 알려십시오.

현재 모유 수유 중이거나 모유 수유를 계획하고 있다면 HCP에게 알려십시오. JEMPERLI가 모유로 전달되는지 여부는 알려지지 않았습니다. JEMPERLI 치료 중 및 마지막 용량 후 4개월 동안 모유 수유를 하지 마십시오.

전반적인 추가 중요 안전성 정보와 [투약 지침](#)을 포함한 전체 [처방 정보](#)는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



실제로 JEMPERLI를 투여하는 환자는 아님.



귀하는 진단과 치료 계획에 대해 더 자신감을 가지고 논의할 자격이 있습니다.

자세한 내용은 JEMPERLI.com을 방문하십시오.

중요한 안전성 정보(계속)

귀하가 투여하는 모든 약물에 대해 **HCP에게 알려십시오**. 여기에는 처방약 및 비처방약, 비타민, 생약 보조제 등이 포함됩니다.

카보플라틴 및 파클리탁셀과 병용되는 JEMPERLI의 가장 흔한 부작용으로는 팔, 손, 다리, 발의 신경 문제; 피로; 오심; 탈모; 관절통; 발진; 변비; 설사; 위 부위(복부) 통증; 숨참; 식욕 감소; 요로 감염; 구토가 있습니다.

단독으로 사용되는 JEMPERLI의 가장 흔한 부작용으로는 피로 및 쇠약, 낮은 적혈구 수(빈혈), 설사, 오심, 변비, 구토가 있습니다.

이것이 발생 가능한 모든 JEMPERLI의 부작용은 아닙니다. 부작용에 대한 의학적 조언을 받으려면 의사에게 연락하십시오.

처방약의 부작용을 FDA에 보고할 것을 권장합니다. www.fda.gov/medwatch를 방문하거나 1-800-FDA-1088로 전화하십시오. 또는 gsk.public.reportum.com 또는 1-888-825-5249을 통해 GSK에 부작용을 보고할 수도 있습니다.

투약 지침을 포함하는 동봉된 전체 **처방 정보**는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

상표는 GSK 그룹이 소유하거나 GSK 그룹이 라이선스를 받은 것입니다.

GSK

©2025 GSK or licensor.
PMUS-DSTBROC250015 September 2025
Produced in USA.

파일 이름: Korean Patient Discussion Guide

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg