



No es una paciente real que toma JEMPERLI.

Cómo hablar sobre el recorrido por el tratamiento con JEMPERLI con su equipo de atención, sus seres queridos y otras personas

Consulte la Información Importante de Seguridad a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com).

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



No es una paciente real que toma JEMPERLI.

Usos aprobados

JEMPERLI es un medicamento recetado que se utiliza para tratar a pacientes adultas con estas afecciones:

- un tipo de cáncer uterino llamado cáncer de endometrio (CE)
 - JEMPERLI puede utilizarse en combinación con los medicamentos quimioterapéuticos carboplatino y paclitaxel, y posteriormente, JEMPERLI puede utilizarse solo en los siguientes casos:
 - cuando el cáncer se ha propagado fuera del útero (avanzado) ◦
 - el cáncer ha regresado.
 - JEMPERLI puede utilizarse solo en los siguientes casos:
 - cuando una prueba de laboratorio indique que el tumor es deficiente en la reparación de los errores de emparejamiento (dMMR, Mismatch Repair Deficient), y
 - el cáncer ha regresado o se ha propagado (CE avanzado), y
 - cuando ha recibido quimioterapia con platino, y no ha funcionado o ya no funciona, y
 - el cáncer no se puede tratar con cirugía ni radiación.

Se desconoce si JEMPERLI es seguro y eficaz en niños.

Información Importante de Seguridad

JEMPERLI es un medicamento que actúa sobre el sistema inmunitario para tratar determinados tipos de cáncer. JEMPERLI puede hacer que su sistema inmunitario ataque los órganos y tejidos normales en cualquier lugar del organismo y puede afectar la forma en que funcionan. En ocasiones, estos problemas pueden resultar graves o poner en peligro la vida y provocar la muerte. Usted puede tener más de uno de estos problemas al mismo tiempo. Estos problemas pueden presentarse en cualquier momento durante el tratamiento o incluso después de haberlo finalizado.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg

Cómo iniciar una conversación útil con su equipo de atención

Es una buena idea **planificar con anticipación** para que pueda sentirse más preparada y lista para hacer preguntas.

Antes de su cita:



Tómese un momento para reflexionar y pensar en las preguntas que le gustaría hacer a su médico durante su visita. Por ejemplo:

- ¿En qué etapa de mi proceso de tratamiento me encuentro actualmente?
- ¿Qué es una prueba de biomarcadores?
 - ¿Qué tipo de información proporcionan los resultados de mi prueba de biomarcadores?



Imprima las páginas 4 y 5 de esta guía para conversar y lleve un bolígrafo o lo que prefiera para tomar notas.



Si puede, considere invitar a un ser querido.

- Es posible que necesite apoyo. Si otra persona la puede acompañar para escuchar y ayudar a procesar lo que le dice el médico, invítela.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Llame o consulte a su proveedor de atención médica (HCP, healthcare provider) de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o empeoran los existentes, incluidos los siguientes:

Problemas pulmonares. Los signos y síntomas pueden incluir tos, dificultad respiratoria o dolor en el pecho.

Problemas intestinales. Los signos y síntomas pueden incluir diarrea o más deposiciones que de costumbre; heces negras, alquitranadas, pegajosas o con sangre o mucosidad; o sensibilidad o dolor intenso en el área del estómago (abdomen).

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Durante su cita:



El equipo de atención está siempre disponible para responder todas las dudas que tenga sobre el tratamiento. Los temas que se indican a continuación pueden ayudarle a sentirse más segura a la hora de iniciar la conversación:

Introducción

¿Por qué se eligió JEMPERLI como opción de tratamiento para mí? _____

¿Cómo pueden saber si JEMPERLI será eficaz en mi caso? ¿Cómo se estudió JEMPERLI en el tipo de cáncer de endometrio que tengo? _____

¿Cómo puedo ponerme en contacto con un programa de apoyo para pacientes que usan JEMPERLI? _____

¿Dónde puedo ponerme en contacto con otras personas que tengan cáncer de endometrio? _____

Administración del tratamiento

¿Cómo se administra JEMPERLI? _____

¿Qué debo hacer para prepararme para mi infusión? _____

¿Cuánto tiempo dura cada infusión? _____

¿Cuánto tiempo durará mi tratamiento? _____

Información Importante de Seguridad (continuación)

Llame o consulte a su proveedor de atención médica (HCP) de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o empeoran los existentes, incluidos los siguientes (continuación):

Problemas hepáticos. Los signos y síntomas pueden incluir piel o parte blanca de los ojos amarillentas, náuseas o vómitos intensos, dolor en el lado derecho del área del estómago (abdomen), orina oscura (como el té) o sangrado o moretones que se forman con mayor facilidad de lo habitual.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Administración del tratamiento (continuación)

¿Cuándo y cómo sabré si el tratamiento está funcionando? _____

Posibles síntomas asociados al tratamiento

¿Qué efectos secundarios puedo experimentar durante el tratamiento? _____

¿Cómo se controlan los efectos secundarios? _____

¿Cuál es la mejor manera de ponerme en contacto con mi equipo de atención si creo que tengo efectos secundarios?

Esté atenta y hable con su equipo de atención sobre todos los efectos secundarios que experimente.



¿Quiere obtener más información sobre los efectos secundarios de JEMPERLI?

Visite JEMPERLI.com

Después de su cita:



Es habitual que después de la cita siga teniendo algunas dudas y surjan otras nuevas. **No dude en ponerse en contacto con su equipo de atención o en programar una visita de seguimiento para aclarar sus dudas.**

Información Importante de Seguridad (continuación)

Llame o consulte a su proveedor de atención médica (HCP) de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o empeoran los existentes, incluidos los siguientes (continuación):

Problemas con las glándulas hormonales. Los signos y síntomas pueden incluir dolor de cabeza inusual o que no desaparece, sensibilidad ocular a la luz, problemas oculares, latidos cardíacos rápidos, aumento de la sudoración, cansancio extremo, aumento o pérdida de peso, más hambre o sed de lo habitual, orinar con más frecuencia de la habitual, caída de cabello, sensación de frío, estreñimiento, voz más grave, mareo o desmayo, cambios de humor o comportamiento como disminución del deseo sexual, irritabilidad o tendencia al olvido.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Comparta su experiencia con sus seres queridos



El cáncer afecta a toda la familia. Sin embargo, es posible que sus seres queridos no siempre sepan qué decir o hacer. **Si le parece bien, es una buena idea tomar las riendas de la conversación y ayudarlos a entender cómo pueden ser de apoyo.**

Decida cómo quiere hablar sobre su tratamiento.

- Considere la posibilidad de hablar directamente con su familia, de informarles todas las novedades con la ayuda de un diario o de remitir a sus seres queridos a diferentes recursos que les despejen sus dudas. Uno de estos recursos es, por ejemplo, la guía para el cuidador que encontrará en su kit de bienvenida.

Apóyese en las personas en las que confía.

- Las personas que forman parte de su vida quieren ayudar de verdad. No hay por qué sentirse mal por aceptar apoyo cuando lo necesite.
- Puede ser una buena idea tener respuestas concretas cuando pregunten: "¿Qué puedo hacer?". Por ejemplo, ¿quiere ayuda para cocinar, lavar la ropa, hacer las compras o para que la lleven al centro de infusión?

Encuentre tiempo para reunirse con sus seres queridos o para hacer las cosas que le gustan.

- Es importante que se mantenga conectada con lo que más le importa a lo largo de su proceso de tratamiento. Si participa en un grupo de apoyo, también puede probar pasatiempos que resulten gratificantes o divertidos para otras personas que tienen cáncer.

Pregunte a su familia cómo se siente.

- Cambiar la conversación de este modo puede dar a su familia el espacio que necesita para expresar plenamente sus emociones.

Información Importante de Seguridad (continuación)


Llame o consulte a su proveedor de atención médica (HCP) de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o empeoran los existentes, incluidos los siguientes (continuación):

Problemas renales. Los signos y síntomas pueden incluir cambios en la cantidad o el color de la orina, sangre en la orina, hinchazón de tobillos o pérdida de apetito.

Problemas cutáneos. Los signos y síntomas pueden incluir sarpullido, picazón, formación de ampollas o descamación de la piel, inflamación de los ganglios linfáticos, llagas o úlceras dolorosas en la boca, la nariz, la garganta o la zona genital; fiebre o síntomas de tipo gripal.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg



No es una paciente real que toma JEMPERLI.

Información Importante de Seguridad (continuación)

También pueden producirse problemas en otros órganos y tejidos. Estos no son todos los signos y síntomas de problemas del sistema inmunitario que pueden aparecer con JEMPERLI. Llame o consulte a su HCP de inmediato si aparece algún signo o síntoma nuevo o que empeore. Los signos y síntomas pueden incluir dolor en el pecho, latidos cardíacos irregulares, dificultad respiratoria, hinchazón de tobillos, confusión, tendencia al sueño, problemas de memoria, cambios de humor o comportamiento, cuello rígido, problemas de equilibrio, sensación de hormigueo o entumecimiento de brazos o piernas, visión doble, visión borrosa, sensibilidad a la luz, dolor de los ojos, cambios en la visión, dolor o debilidad muscular constantes o intensos, calambres musculares, recuento bajo de glóbulos rojos, moretones.

Reacciones a la infusión que, a veces, pueden ser graves o potencialmente mortales. Los signos y síntomas de reacciones a la infusión pueden incluir escalofríos o temblores, picazón o sarpullido, rubefacción, dificultad respiratoria o sibilancia, mareo, sensación de desmayo, fiebre, dolor de espalda o cuello.

Rechazo de un órgano trasplantado. Su HCP debe indicarle qué signos y síntomas debe informar. Además, deberá realizar un seguimiento, según el tipo de trasplante de órgano que haya recibido.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com).

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg

Cómo hablar del cáncer

Es posible que sienta una mezcla de emociones al hablar del cáncer. Sin embargo, compartir la noticia puede ayudarla a sentir que tiene un mayor control de su experiencia. Desde sus amigos y familiares más cercanos hasta sus colegas y la comunidad, **es importante que piense con quién quiere compartir esta información y cómo quiere decírselo.**

- Usted decide cómo compartir su experiencia, o si quiere compartirla.
 - Si quiere hablar de ello, piense primero en hacer una lista de las personas a las que quiere contárselo. Luego, piense qué detalles específicos quiere compartir durante la primera conversación.
- Si quiere hablar en persona, considere elegir un lugar tranquilo en el que se sienta más cómoda.
 - Intente introducir el tema poco a poco y, si tiene dificultades, puede empezar diciendo algo como: "Como sabes, no me he sentido bien últimamente".
- También puede plantearse compartir la noticia por teléfono o por carta si le resulta más cómodo.
- A veces, puede resultar más fácil hablar con alguien que aún no la conoce.
 - Considere la posibilidad de unirse a un grupo de apoyo o de buscar una comunidad en línea para hablar de forma anónima con otras personas que saben por lo que está pasando.



¿Desea obtener más información sobre lo que puede esperar en todo el proceso de tratamiento del cáncer de endometrio?

Visite JEMPERLI.com

Información Importante de Seguridad (continuación)

Complicaciones, incluida la enfermedad del injerto contra el huésped (EICH), en personas que han recibido un trasplante de médula ósea (células madre) en el que se utilizan células madre de un donante (alogénico). Estas complicaciones pueden ser graves y causar la muerte. Estas complicaciones se pueden producir si se sometió a un trasplante antes o después de recibir tratamiento con JEMPERLI. Su HCP la vigilará para detectar estas complicaciones.

Si recibe tratamiento médico de inmediato podría evitar que estos problemas se agraven. Su HCP la examinará para detectar estos problemas durante el tratamiento con JEMPERLI y podrá administrarle corticosteroides o medicamentos de reemplazo hormonal. Si tiene efectos secundarios graves, es posible que su HCP también deba retrasar o suspender de forma definitiva el tratamiento con JEMPERLI.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



No es una paciente real que toma JEMPERLI.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Antes de recibir JEMPERLI, informe a su HCP sobre todas las afecciones médicas que tiene; entre estas, las siguientes: problemas del sistema inmunitario, como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o lupus; ha recibido un trasplante de órgano; ha recibido o tiene previsto recibir un trasplante de células madre en el que se utilicen células madre de un donante (alogénico); ha recibido radioterapia en la zona torácica; padece alguna enfermedad que afecte al sistema nervioso, como miastenia grave o síndrome de Guillain-Barré.

Si está embarazada o planea quedar embarazada, infórmelo a su HCP. JEMPERLI puede dañar al feto. Si puede quedar embarazada, su HCP le realizará una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento. Utilice un método anticonceptivo eficaz durante su tratamiento y durante los 4 meses siguientes a la última dosis de JEMPERLI. Si queda embarazada durante su tratamiento con JEMPERLI o si cree que podría estar embarazada, infórmelo de inmediato a su HCP.

Si está amamantando o planea amamantar, infórmelo a su HCP. Se desconoce si JEMPERLI pasa a través de la leche materna. No amamante durante todo el tratamiento con JEMPERLI ni durante los cuatro meses posteriores a la administración de la última dosis.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



No es una paciente real que toma JEMPERLI.



Merece sentirse más segura al hablar de su diagnóstico y su plan de tratamiento.

Visite [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com) para obtener más información

Información Importante de Seguridad (continuación)

Infórmele a su HCP sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

Los efectos secundarios más frecuentes de JEMPERLI cuando se administra con carboplatino y paclitaxel incluyen problemas nerviosos en los brazos, las manos, las piernas y los pies; cansancio; náuseas; caída del cabello; dolor articular; sarpullido; estreñimiento; diarrea; dolor en el área del estómago (abdomen); dificultad respiratoria; disminución del apetito disminuido; infecciones de las vías urinarias; vómitos.

Los efectos secundarios más frecuentes de JEMPERLI cuando se usa solo son cansancio y debilidad, recuento bajo de glóbulos rojos (anemia), diarrea, náuseas, estreñimiento y vómitos. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de JEMPERLI. Comuníquese con su médico para recibir asesoramiento sobre los efectos secundarios.

Se recomienda informar de los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, Food and Drug Administration). Para ello, llame al 1-800-FDA-1088 o visite www.fda.gov/medwatch. Si así lo desea, también puede informar de los efectos secundarios negativos a GSK. Para ello, llame al 1-888-825-5249 o visite gsk.publicreportum.com.

Consulte la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com).

Las marcas comerciales son propiedad del grupo de empresas de GSK o se le han otorgado bajo licencia.



©2025 GSK or licensor.
PMUS-DSTBROC250012 August 2025
Produced in USA.

Nombre del archivo: Spanish Patient Discussion Guide

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg