



Hướng dẫn thảo luận



Đây không phải là bệnh nhân thật đang dùng JEMPERLI.

Cách trao đổi về hành trình điều trị bằng JEMPERLI của quý vị với đội ngũ chăm sóc, người thân và những người khác

Vui lòng xem Thông tin An toàn quan trọng được đặt xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



Đây không phải là bệnh nhân thật đang dùng JEMPERLI.

Trường hợp sử dụng được phê duyệt

JEMPERLI là thuốc kê đơn dùng để điều trị cho người lớn mắc:

- một loại ung thư tử cung được gọi là ung thư nội mạc tử cung (EC)
 - JEMPERLI có thể được sử dụng kết hợp với thuốc hóa trị carboplatin và paclitaxel, sau đó, JEMPERLI có thể được cho dùng riêng:
 - khi bệnh ung thư của quý vị đã di căn ra ngoài tử cung (tiến triển) **hoặc**,
 - bệnh ung thư của quý vị tái phát.
 - JEMPERLI có thể được cho dùng riêng:
 - khi xét nghiệm cho thấy khối u của quý vị bị thiếu hụt sửa chữa bắt cặp sai (dMMR) **và**
 - bệnh ung thư của quý vị tái phát hoặc đã di căn (EC tiến triển) **và**
 - quý vị đã được hóa trị bằng thuốc có chứa platinum và phương pháp điều trị đó không có tác dụng hoặc không còn tác dụng nữa **và**
 - không thể điều trị bệnh ung thư của quý vị bằng phẫu thuật hoặc xạ trị.

Chưa rõ JEMPERLI có an toàn và hiệu quả ở trẻ em không.

Thông tin An toàn quan trọng

JEMPERLI là loại thuốc có thể điều trị một số bệnh ung thư bằng cách phối hợp với hệ miễn dịch của quý vị. JEMPERLI có thể khiến hệ miễn dịch của quý vị tấn công các cơ quan và mô bình thường tại bất kỳ phần nào trong cơ thể và có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan/mô đó. Những vấn đề này đôi khi có thể trở nên nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng và có thể dẫn đến tử vong. Quý vị có thể gặp nhiều vấn đề cùng một lúc. Những vấn đề này có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong quá trình điều trị hoặc thậm chí sau khi quá trình điều trị kết thúc.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng được đặt xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Bắt đầu một cuộc thảo luận hữu ích với đội ngũ chăm sóc của quý vị

Quý vị nên lên kế hoạch trước để cảm thấy chuẩn bị tốt và sẵn sàng hơn khi đặt câu hỏi.

Trước buổi hẹn:



Dành chút thời gian để suy ngẫm và nghĩ đến những câu hỏi mà quý vị có thể muốn hỏi bác sĩ trong buổi thăm khám. Ví dụ:

- Tôi đang ở giai đoạn nào trong hành trình điều trị?
- Xét nghiệm dấu ấn sinh học là gì?
 - Kết quả xét nghiệm dấu ấn sinh học của tôi cung cấp những loại thông tin gì?



In ra trang 4 - 5 của hướng dẫn thảo luận này và mang theo bút hoặc cách ghi chú mà quý vị ưa thích.



Nếu có thể, hãy cân nhắc mời một người thân đi cùng.

- Quý vị có thể sẽ cần được hỗ trợ. Ngoài ra, có một người ở đó cùng nghe và giúp quý vị diễn giải những thông tin mà bác sĩ nói có thể cũng là một ý hay

Thông tin An toàn quan trọng (tiếp)

Hãy gọi điện cho hoặc thăm khám với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (HCP) ngay nếu quý vị có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng mới hoặc xấu đi nào, bao gồm:

Các vấn đề về phổi. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm ho, khó thở hoặc đau ngực.

Các vấn đề về tiêu hóa. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm tiêu chảy hoặc đi ngoài nhiều hơn bình thường; phân có màu đen, giống hắc ín, dính hoặc có máu hay chất nhầy; hay quý vị thấy đau hoặc nhạy cảm nghiêm trọng ở vùng bụng.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng được đặt xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Trong buổi hẹn:



Đội ngũ chăm sóc luôn sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của quý vị về quá trình điều trị. Các chủ đề thảo luận dưới đây có thể giúp quý vị tự tin hơn khi bắt đầu cuộc trao đổi:

Bắt đầu

Tại sao JEMPERLI được chọn làm phương án điều trị cho tôi? _____

Làm sao quý vị biết là JEMPERLI có hiệu quả với tôi không? JEMPERLI đã được nghiên cứu như thế nào trên loại ung thư nội mạc tử cung của tôi? _____

Làm thế nào để tôi có thể tham gia chương trình hỗ trợ dành cho bệnh nhân dùng JEMPERLI? _____

Tôi có thể kết nối với những người cũng đang phải đối mặt với ung thư nội mạc tử cung ở đâu? _____

Nhận điều trị

Tôi sẽ được cho dùng JEMPERLI như thế nào? _____

Tôi nên làm gì để chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình tiêm truyền thuốc? _____

Mỗi lần truyền mất bao lâu? _____

Tôi sẽ phải điều trị trong bao lâu? _____

Thông tin An toàn quan trọng (tiếp)

Hãy gọi điện cho hoặc thăm khám với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (HCP) ngay nếu quý vị có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào mới hoặc xấu đi, bao gồm (tiếp):

Các vấn đề về gan. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm vàng da hoặc lòng trắng mắt chuyển màu vàng, buồn nôn hoặc nôn dữ dội, đau ở bên phải vùng bụng, nước tiểu sẫm màu (màu trà), dễ chảy máu hoặc bầm tím hơn bình thường.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng được đặt xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Nhận điều trị (tiếp)

Khi nào và bằng cách nào tôi sẽ biết được là phương pháp điều trị của mình có hiệu quả hay không? _____

Quý vị có thể cảm thấy thế nào

Tôi có thể gặp phải những loại tác dụng phụ gì trong quá trình điều trị? _____

Tác dụng phụ mà tôi gặp phải sẽ được theo dõi như thế nào? _____

Nếu tôi nghĩ mình đang gặp tác dụng phụ, cách tốt nhất để liên hệ với đội ngũ chăm sóc của tôi là gì? _____

Hãy để ý mọi tác dụng phụ mà quý vị gặp phải và trao đổi với đội ngũ chăm sóc.



Quý vị muốn tìm hiểu thêm về tác dụng phụ của JEMPERLI?

Truy cập JEMPERLI.com

Sau buổi hẹn:



Việc vẫn còn thắc mắc và nghĩ ra câu hỏi mới sau buổi hẹn là điều bình thường. **Đừng ngần ngại liên hệ với đội ngũ chăm sóc của quý vị hoặc lên lịch tái khám để được giải đáp mọi câu hỏi.**

Thông tin An toàn quan trọng (tiếp)

Hãy gọi điện cho hoặc thăm khám với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (HCP) ngay nếu quý vị có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào mới hoặc xấu đi, bao gồm (tiếp):

Các vấn đề về tuyến nội tiết. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm đau đầu không dứt hoặc đau đầu bất thường, mắt nhạy cảm với ánh sáng, các vấn đề về mắt, nhịp tim nhanh, đổ mồ hôi nhiều, mệt mỏi cực độ, tăng cân hoặc giảm cân, cảm thấy đói hoặc khát nhiều hơn bình thường, đi tiểu thường xuyên hơn bình thường, rụng tóc, cảm thấy ớn lạnh, táo bón, giọng nói trầm hơn, chóng mặt hoặc ngất xỉu, thay đổi tâm trạng hoặc hành vi như giảm ham muốn tình dục, cáu kỉnh hoặc hay quên.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng được đặt xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Chia sẻ trải nghiệm của quý vị với người thân



Bệnh ung thư ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình quý vị. Tuy nhiên, người thân của quý vị không phải lúc nào cũng biết phải nói hay làm gì. **Nếu quý vị cảm thấy thoải mái, hãy chủ động dẫn dắt cuộc trò chuyện và giúp họ hiểu được họ có thể làm gì để hỗ trợ quý vị.**

Quyết định cách quý vị muốn chia sẻ về hành trình điều trị của mình.

- Hãy cân nhắc việc nói chuyện trực tiếp với gia đình, cung cấp thông tin cập nhật bằng nhật ký hoặc hướng dẫn người thân tìm đến các nguồn tài nguyên như hướng dẫn dành cho người đồng hành chăm sóc trong bộ tài liệu chào mừng để giúp giải đáp các câu hỏi của họ

Dựa dẫm vào những người mà quý vị tin tưởng.

- Những người quanh quý vị chân thành muốn giúp đỡ quý vị. Không cần phải thấy tồi tệ về việc chấp nhận sự hỗ trợ từ người khác khi cần
- Có sẵn câu trả lời cụ thể khi họ hỏi "Tôi có thể làm gì?" có thể là ý hay, ví dụ như bạn có muốn tôi giúp nấu ăn, giặt giũ, mua đồ tạp hóa hay sắp xếp phương tiện đưa đến trung tâm tiêm truyền không?

Tìm thời gian gặp gỡ những người quý vị yêu quý hoặc làm những việc quý vị thích.

- Điều quan trọng là phải luôn tập trung vào những gì quan trọng nhất với quý vị trong suốt hành trình điều trị. Nếu tham gia nhóm hỗ trợ, quý vị cũng có thể thử tìm hiểu sở thích mà những người cũng đang phải đối mặt với ung thư thấy vui hoặc bổ ích, đáng làm

Hỏi thăm gia đình quý vị xem họ cảm thấy thế nào.

- Chuyển hướng cuộc trò chuyện theo cách này có thể mang lại không gian mà gia đình quý vị cần để thể hiện trọn vẹn cảm xúc của họ

Thông tin An toàn quan trọng (tiếp)


Hãy gọi điện cho hoặc thăm khám với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (HCP) ngay nếu quý vị có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào mới hoặc xấu đi, bao gồm (tiếp):

Các vấn đề về thận. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm thay đổi về lượng hoặc màu sắc nước tiểu, nước tiểu có máu, sưng mắt cá chân hoặc chán ăn.

Các vấn đề về da. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm phát ban; ngứa; da phồng rộp hoặc bong tróc; sưng hạch bạch huyết; xuất hiện vết loét hoặc vết đau ở miệng hoặc mũi, họng hoặc bộ phận sinh dục; sốt hoặc các triệu chứng giống như cúm.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng được đặt xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



Đây không phải là bệnh nhân thật đang dùng JEMPERLI.

Thông tin An toàn quan trọng (tiếp)

Các vấn đề cũng có thể xảy ra tại các cơ quan và mô khác. Đây không phải là tất cả các dấu hiệu và triệu chứng của các vấn đề về hệ miễn dịch có thể xảy ra khi dùng JEMPERLI. Hãy gọi điện cho hoặc thăm khám với HCP ngay nếu có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng mới hoặc trở nặng nào. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm đau ngực, nhịp tim không đều, khó thở, sưng mắt cá chân; lú lẫn, buồn ngủ, vấn đề về trí nhớ, thay đổi tâm trạng hoặc hành vi, cứng cổ, vấn đề mất thăng bằng, ngứa ran hoặc tê bì ở tay hoặc chân; song thị, mờ mắt, nhạy cảm với ánh sáng, đau mắt, thay đổi thị lực; đau cơ dai dẳng hoặc nghiêm trọng hay yếu cơ, chuột rút cơ; giảm số lượng hồng cầu, bầm tím.

Các phản ứng tiêm truyền có thể trở nên nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng. Các dấu hiệu và triệu chứng của phản ứng tiêm truyền có thể bao gồm ớn lạnh hoặc run rẩy, ngứa hoặc phát ban, đỏ mặt, khó thở hoặc thở khò khè, chóng mặt, có cảm giác sắp ngất xỉu, sốt, đau lưng hoặc đau cổ.

Thải tạng ghép. HCP sẽ cho biết quý vị nên báo cáo những dấu hiệu và triệu chứng nào và theo dõi tình trạng của quý vị, tùy thuộc vào loại tạng quý vị được ghép.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng được đặt xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Nói về bệnh ung thư của quý vị

Có thể quý vị sẽ thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn trong lòng khi nói về bệnh ung thư. Tuy nhiên, chia sẻ tin tức có thể giúp quý vị thấy mình đang chủ động kiểm soát trải nghiệm của bản thân tốt hơn. Từ gia đình và những người bạn thân thiết nhất đến đồng nghiệp và cộng đồng xung quanh, **quý vị cần nghĩ xem mình muốn chia sẻ thông tin này với ai và nói với họ như thế nào. Đây là một điều quan trọng.**

- Quý vị có toàn quyền quyết định sẽ chia sẻ trải nghiệm của mình như thế nào hay có muốn chia sẻ hay không
 - Nếu muốn nói ra, trước tiên, hãy cân nhắc việc lập danh sách những người mà quý vị muốn báo tin và nghĩ xem quý vị muốn chia sẻ đến mức nào trong cuộc nói chuyện đầu tiên
- Nếu muốn gặp trực tiếp để nói, cân nhắc chọn một không gian yên tĩnh mà quý vị thấy thoải mái nhất
 - Hãy khơi mào chủ đề thật từ từ, nếu thấy khó, quý vị có thể bắt đầu bằng cách nói những câu như "Bạn biết đấy, gần đây, mình thấy trong người không được khỏe lắm"
- Quý vị cũng có thể cân nhắc báo tin qua thư hoặc điện thoại nếu cách này khiến quý vị thoải mái hơn
- Đôi khi, nói chuyện với một người mà quý vị chưa quen biết có thể sẽ dễ dàng hơn
 - Cân nhắc tham gia nhóm hỗ trợ hoặc tìm cộng đồng trực tuyến để trò chuyện ẩn danh với người khác về những điều mà quý vị đang phải trải qua



Quý vị muốn tìm hiểu thêm về những điều có thể xảy ra trong suốt hành trình đối mặt với ung thư nội mạc tử cung?

Truy cập JEMPERLI.com

Thông tin An toàn quan trọng (tiếp)

Các biến chứng, bao gồm bệnh mảnh ghép chống ký chủ (GVHD), ở những người được ghép tủy xương (tế bào gốc) sử dụng tế bào gốc của người hiến tặng (đồng loài). Những biến chứng này có thể rất nghiêm trọng và có thể dẫn tới tử vong. Những biến chứng này có thể xảy ra nếu quý vị được ghép trước hoặc sau khi điều trị bằng JEMPERLI. HCP sẽ theo dõi tình trạng của quý vị để phát hiện những biến chứng này.

Việc điều trị y tế ngay lập tức có thể giúp ngăn những vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn. HCP sẽ kiểm tra tình trạng của quý vị để phát hiện những vấn đề này trong quá trình điều trị bằng JEMPERLI và có thể dùng thuốc corticosteroid hoặc thuốc thay thế hormone để điều trị cho quý vị. Nếu quý vị gặp tác dụng phụ nghiêm trọng, HCP cũng có thể cần phải trì hoãn hoặc ngừng hẳn việc điều trị bằng JEMPERLI.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng được đặt xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



Đây không phải là bệnh nhân thật đang dùng JEMPERLI.

Thông tin An toàn quan trọng (tiếp)

Trước khi quý vị điều trị bằng JEMPERLI, hãy thông báo cho HCP về tất cả các tình trạng bệnh lý của quý vị, bao gồm các vấn đề về hệ miễn dịch như bệnh Crohn, viêm loét đại tràng hoặc lupus ban đỏ; quý vị đã được ghép tạng hay chưa; quý vị đã thực hiện ghép tế bào gốc bằng tế bào gốc của người hiến tặng (đồng loài) hay chưa hoặc có kế hoạch đó không; quý vị đã được điều trị bằng phương pháp xạ trị ở vùng ngực chưa; quý vị có mắc một tình trạng bệnh lý nào ảnh hưởng đến hệ thần kinh không, chẳng hạn như bệnh nhược cơ hoặc hội chứng Guillain-Barré.

Nếu quý vị đang mang thai hoặc có kế hoạch mang thai, hãy thông báo cho HCP.

JEMPERLI có thể gây hại cho thai nhi. Nếu quý vị có khả năng mang thai, HCP sẽ yêu cầu quý vị thử thai trước khi bắt đầu điều trị. Quý vị nên dùng biện pháp tránh thai hiệu quả trong quá trình điều trị và trong 4 tháng sau liều JEMPERLI cuối cùng. Trong quá trình điều trị bằng JEMPERLI, hãy thông báo ngay cho HCP nếu quý vị có thai hoặc cho rằng mình có thể đã có thai.

Nếu quý vị đang cho con bú hoặc có kế hoạch cho con bú, hãy thông báo cho HCP. Chưa biết liệu JEMPERLI có truyền sang sữa mẹ hay không. Không cho con bú trong thời gian điều trị bằng JEMPERLI và trong vòng 4 tháng sau liều JEMPERLI cuối cùng.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng được đặt xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



Đây không phải là bệnh nhân thật đang dùng JEMPERLI.



Quý vị xứng đáng được cảm thấy tự tin hơn khi thảo luận về chẩn đoán và kế hoạch điều trị của mình

Truy cập [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com) để tìm hiểu thêm

Thông tin An toàn quan trọng (tiếp)

Hãy thông báo cho HCP về mọi loại thuốc quý vị dùng, bao gồm thuốc kê đơn và không cần kê đơn, vitamin và thực phẩm bổ sung từ thảo dược.

Các tác dụng phụ thường gặp nhất của JEMPERLI khi sử dụng kết hợp với carboplatin và paclitaxel bao gồm các vấn đề dây thần kinh ở cánh tay, bàn tay, chân và bàn chân; mệt mỏi; buồn nôn; rụng tóc; đau khớp; phát ban; táo bón; tiêu chảy; đau vùng bụng; khó thở; chán ăn; nhiễm trùng đường tiết niệu; nôn mửa.

Các tác dụng phụ thường gặp nhất của JEMPERLI khi sử dụng riêng bao gồm mệt mỏi và suy nhược, giảm số lượng hồng cầu (thiếu máu), tiêu chảy, buồn nôn, táo bón, nôn mửa.

Đây không phải toàn bộ tác dụng phụ có thể xảy ra của JEMPERLI. Hãy gọi cho bác sĩ của quý vị để được tư vấn y tế về các tác dụng phụ.

Quý vị nên báo cáo các tác dụng phụ bất lợi của thuốc kê đơn cho Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). Truy cập www.fda.gov/medwatch hoặc gọi đến số 1-800-FDA-1088. Quý vị cũng có thể báo cáo tác dụng phụ bất lợi cho GSK tại gsk.public.reportum.com hoặc 1-888-825-5249.

Vui lòng xem [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com).

Các nhãn hiệu đều thuộc sở hữu của hoặc đã được cấp phép cho nhóm các công ty GSK.

GSK

©2025 GSK or licensor.
PMUS-DSTBROC250016 September 2025
Produced in USA.

Tên tệp: Vietnamese Patient Discussion Guide

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg