



术语表

常见治疗术语

晚期或复发性子宫内膜癌：已扩散到子宫外或治疗后复发的子宫内膜癌。常见症状可包括阴道出血、食欲下降、不明原因的体重下降或骨盆、臀部、腹部或背部疼痛。

生物标志物：在您身体的组织或体液中发现的一种分子，可以显示某种状况、过程或疾病是正常还是异常。某些生物标志物可提供有关您癌症的重要信息，并可帮助您的医生决定哪些治疗方案（包括 JEMPERLI）可能适合您。

活检：切除一小块组织进行检测的程序。

卡铂：一种通过破坏细胞 DNA 来治疗癌症的化学疗法。

化疗：一种癌症治疗方法，通过杀死细胞或阻止细胞分裂和增殖来阻止或减缓癌细胞生长。

阴道镜检查：一种评估宫颈细胞的程序。

CT 扫描或计算机断层扫描：显示内脏器官的影像。

D&C 或扩张宫颈与刮宫术：从子宫中取出一小块组织进行检测的手术。

批准用途

JEMPERLI 是一种处方药，用于治疗患有以下疾病的成年人：

- 一种被称为子宫内膜癌 (EC) 的子宫癌症
 - 在以下情况下，JEMPERLI 可单独使用：
 - 当实验室检查显示肿瘤存在错配修复缺陷 (dMMR)，并且
 - 您的癌症复发或已经扩散（晚期 EC），并且
 - 您接受了含有铂的化疗，但该疗法无效或不再有效，并且
 - 您的癌症无法通过手术或放射治疗。
 - 在以下情况下，JEMPERLI 可与化疗药物卡铂和紫杉醇联合使用，之后，JEMPERLI 可单独使用：
 - 当癌症扩散到子宫外（晚期）时或者
 - 癌症复发时。

尚不清楚 JEMPERLI 对儿童是否安全有效。

重要安全信息

JEMPERLI 是一种可以通过与免疫系统协同作用来治疗某些癌症的药物。JEMPERLI 可导致您的免疫系统攻击身体任何部位的正常器官和组织，并影响这些器官和组织的工作方式。这些问题有时会变得严重或危及生命，并可能导致死亡。您可能同时出现多个这样的问题。这些问题可能在治疗期间的任何时候发生，甚至在治疗结束后也可能发生。

请参阅全文中的其他重要安全信息，以及完整**处方信息**（包括**用药指南**），也可在 JEMPERLI.com 上获取。

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg





术语表

常见治疗术语（续）

dMMR 或错配修复缺陷：描述 MMR 系统工作不正常、不能纠正基因错误的癌症。dMMR 是子宫内膜癌的一个重要生物标志物。

DOR 或缓解持续时间：对治疗有反应的研究参与者在癌症再次开始生长或扩散之前的时间。

子宫内膜癌：始于子宫内膜组织的癌症。常见症状可包括阴道异常出血和骨盆疼痛。

妇科检查或盆腔检查：医生检查子宫、阴道、卵巢和直肠，寻找任何异常发现。

免疫疗法：一种旨在与人体免疫系统协同攻击癌细胞的治疗方法。

IV 或静脉注射：将药物注入静脉。

林奇综合征：一种会增加子宫内膜癌风险的遗传性疾病。

中位数：一组数据的中间数，也称为中点。

MMR 或错配修复：MMR 系统可纠正正常细胞生长过程中基因中发生的错误。

MMRp 或错配修复功能正常：描述 MMR 系统工作正常、能够纠正基因错误的癌症。

重要安全信息（续）

如果您出现任何新的或恶化的体征或症状，请立即致电医疗保健提供者 (HCP) 或在 HCP 处就诊，包括：

肺部问题。体征和症状可能包括咳嗽、呼吸短促或胸痛。

肠道问题。体征和症状可能包括腹泻或排便次数比平时多；粪便呈黑色、柏油状、粘稠状，或带有血液或粘液；或严重的胃部（腹部）疼痛或压痛。

肝脏问题。体征和症状可能包括皮肤或眼白发黄、严重的恶心或呕吐、胃部（腹部）右侧疼痛、尿液呈深色（茶色），或比平时更容易出血或瘀伤。

激素腺问题。体征和症状可能包括持续的头痛或不寻常的头痛、眼睛对光敏感、眼睛问题、心跳加快、出汗增多、极度疲倦、体重升高或体重下降、感觉比平时更饥饿或更口渴、小便比平时更频繁、脱发、感觉寒冷、便秘、声音变得更低沉、头晕或昏厥、情绪或行为发生变化（如性欲减退、易激惹或健忘）。

请参阅全文中的其他重要安全信息，
以及完整**处方信息**（包括**用药指南**），
也可在 JEMPERLI.com 上获取。

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



术语表

常见治疗术语（续）

MRI 或磁共振成像：使用无线电波和强磁铁提供身体内部详细图像的扫描。

MSI-H 或高微卫星不稳定性：描述由于 MMR 系统不能正确修复错误而可能发生的某些肿瘤中的不稳定基因。MSI-H 是子宫内膜癌的一个重要生物标志物。

MSS 或微卫星稳定：描述由于 MMR 系统工作正常、能够纠正基因错误而具有稳定基因的癌症。

OS 或总生存期：开始治疗后患者的平均生存时间。

紫杉醇：一种阻止癌细胞生长和分裂的化学疗法。

PET 扫描或正电子发射断层扫描：显示癌细胞位置的影像。

PFS 或无进展生存期：指研究参与者的癌症没有生长、扩散或恶化的时间长度。

安慰剂：一种设计成外观类似于被测试药物的非活性物质。

放射疗法：一种利用 X 射线和其他来源的强光束杀死癌细胞的癌症治疗方法。

超声：使用声波创建内脏器官的图像。

子宫：位于骨盆中的一个小的中空梨形器官，胎儿在其中发育。

重要安全信息（续）

如果您出现任何新的或恶化的体征或症状，请立即致电医疗保健提供者 (HCP) 或在 HCP 处就诊，包括（续）：

肾脏问题。体征和症状可能包括尿量或尿液颜色发生变化、尿液中有血、脚踝肿胀或无食欲。

皮肤问题。体征和症状可能包括皮疹；瘙痒；皮肤水疱或脱皮；淋巴结肿胀；口腔、鼻子、喉咙或生殖器部位出现疼痛的疮或溃疡；发热或流感样症状。

其他器官和组织也可能出现问题。这些并不是 JEMPERLI 可能出现的所有免疫系统问题体征和症状。如果出现任何新的或更严重的体征或症状，请立即致电 HCP 或在 HCP 处就诊。体征和症状可能包括胸痛、心律不齐、呼吸短促、脚踝肿胀；意识模糊、嗜睡、记忆力问题、情绪或行为变化、颈部僵硬、平衡问题、手臂或腿部刺痛或麻木；复视、视物模糊、对光敏感、眼睛疼痛、视力变化；持续或严重的肌肉疼痛或无力、肌肉痉挛；红细胞减少、瘀伤。

请参阅全文中的其他重要安全信息，
以及完整**处方信息**（包括**用药指南**），
也可在 JEMPERLI.com 上获取。

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



想要了解更多对您的治疗有帮助的资源？
访问 [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com)

重要安全信息（续）

输液反应有时会很严重甚至危及生命。输液反应的体征和症状可能包括发冷或发抖、瘙痒或皮疹、潮红、呼吸短促或哮喘、头晕、感觉像要晕过去、发热、背部或颈部疼痛。

移植器官排斥。您的 HCP 应根据您所接受的器官移植类型，告诉您应该报告哪些体征和症状，并对您进行监测。

接受使用供体干细胞（同种异体）的骨髓（干细胞）移植的人群的并发症，包括移植物抗宿主病 (GVHD)。这些并发症可能很严重，甚至可能导致死亡。如果您在接受 JEMPERLI 治疗之前或之后接受移植，可能会发生这些并发症。您的 HCP 将监测您是否出现这些并发症。

立即接受治疗有助于防止这些问题变得更加严重。在使用 JEMPERLI 治疗期间，您的 HCP 将检查您是否存在这些问题，并可能使用皮质类固醇或激素替代药物对您进行治疗。如果您出现严重的副作用，HCP 可能还需要延迟或完全停止 JEMPERLI 治疗。

在接受 JEMPERLI 治疗之前，告知 HCP 您的所有病症，包括：免疫系统问题，如克罗恩病、溃疡性结肠炎或狼疮；接受过器官移植；接受过或计划接受使用供体干细胞（同种异体）的干细胞移植；接受过胸部放射治疗；患有影响神经系统的疾病，如重症肌无力或格林巴利综合征。

如果您已经怀孕或正在备孕，请告知您的 HCP。JEMPERLI 可能会伤害未出生的婴儿。如果您能够怀孕，在您开始治疗之前，HCP 将为您进行妊娠试验。在治疗期间以及最后一次 JEMPERLI 给药后 4 个月内使用有效的避孕措施。如果您在接受 JEMPERLI 治疗期间怀孕，或者您认为您可能怀孕，请立即告知您的 HCP。

如果您正在哺乳或计划哺乳，请告知您的 HCP。JEMPERLI 是否会进入母乳，目前尚不清楚。在 JEMPERLI 治疗期间以及最后一次给药后 4 个月内不要哺乳。

告知 HCP 您服用的所有药物，包括处方药和非处方药、维生素和草药补充剂。

JEMPERLI 与卡铂和紫杉醇联合使用时最常见的副作用包括：手臂、手、腿和脚的神经问题；疲倦；恶心；脱发；关节疼痛；皮疹；便秘；腹泻；胃部（腹部）疼痛；呼吸短促；食欲下降；尿路感染；呕吐。

JEMPERLI 单独使用时最常见的副作用包括：疲倦和无力、红细胞计数低（贫血）、腹泻、恶心、便秘、呕吐。

这些并非 JEMPERLI 的所有可能副作用。请致电您的医生，征求有关副作用的医疗建议。

我们鼓励您拨打 1-800-FDA-1088 或访问 www.fda.gov/medwatch 向 FDA 报告处方药的不良副作用。

请参阅完整处方信息（包括用药指南），也可在 [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com) 上获取。

商标归 GSK 公司集团所有或经许可后使用。

GSK ©2024 GSK or licensor.
PMUS-DSTBROC240069 November 2024
Produced in USA.

文件名：Chinese Patient Glossary

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg