



Словарь часто встречающихся терминов, касающихся лечения

dMMR, или дефицит репарации ошибочно спаренных оснований ДНК. Означает раковые опухоли, в которых система MMR не исправляет ошибки в генах должным образом. dMMR является важным биомаркером рака эндометрия.

MMR, или репарация ошибочно спаренных оснований ДНК. Система MMR исправляет ошибки, возникающие в генах в ходе нормального роста клеток.

MMRp, или сохраненная репарация ошибочно спаренных оснований ДНК. Означает раковые опухоли, у которых система MMR работает правильно и исправляет ошибки в генах.

MSI-H, или высокая микросателлитная нестабильность. Означает нестабильные гены в некоторых опухолях, которые могут появляться из-за того, что система MMR не исправляет ошибки должным образом. MSI-H является важным биомаркером рака эндометрия.

MSS, или микросателлитная стабильность. Означает раковые опухоли со стабильными генами вследствие того, что система MMR работает правильно и исправляет ошибки в генах.

Биомаркер. Молекула, находящаяся в тканях и жидкостях вашего организма, по которой можно определить, является ли состояние, процесс или заболевание обычным или аномальным. Определенные биомаркеры могут дать важную информацию о вашей опухоли и помочь вашему врачу принять решение, какие варианты лечения, включая препарат JEMPERLI, могут вам подойти.

Биопсия. Процедура взятия небольшого кусочка тканей для исследования.

Одобренное применение

JEMPERLI — это отпускаемый по рецепту лекарственный препарат, который применяется для лечения взрослых при таком заболевании, как:

- разновидность рака матки, которая называется раком эндометрия (РЭ)
 - JEMPERLI можно применять в комбинации с химиотерапевтическими препаратами карбоплатином и паклитакселом, а после этого можно продолжать применять только препарат JEMPERLI:
 - если рак матки распространился за ее пределы (поздняя стадия); **или**
 - если рак опять начал расти.
 - JEMPERLI можно применять отдельно:
 - если лабораторный анализ показал, что Ваша опухоль имеет дефицит репарации ошибочно спаренных оснований ДНК (dMMR); **и**
 - если рак опять начал расти или распространился за пределы матки (поздняя стадия РЭ); **и**
 - вы прошли курс химиотерапии с препаратом платины, и это лечение не помогло или перестало помогать; **и**
 - для лечения рака Вам не подходит хирургическая операция или лучевая терапия.

Неизвестно, можно ли безопасно и эффективно применять препарат JEMPERLI у детей.

Важная Информация о Безопасности

JEMPERLI — это лекарственный препарат, который применяется для лечения некоторых видов рака, воздействуя на иммунную систему. Препарат JEMPERLI может приводить к тому, что иммунная система будет атаковать любые здоровые органы и ткани в Вашем организме и нарушать их работу. Иногда эти проблемы могут стать тяжелыми или опасными для жизни и даже могут привести к смерти. У Вас может возникнуть несколько этих проблем одновременно. Эти проблемы могут возникнуть в любой момент во время лечения или даже после его окончания.

Пожалуйста, полностью ознакомьтесь с дополнительной важной информацией о безопасности, а также с полной [инструкцией по применению](#), включая [руководство по применению лекарственного препарата](#). Эти документы также доступны на сайте JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



Словарь часто встречающихся терминов, касающихся лечения (продолжение)

В/в, или внутривенно. Введение лекарственного препарата в вену.

ВБП, или выживаемость без прогрессирования. Период времени, в течение которого у участников исследования не наблюдалось роста, распространения или ухудшения течения рака.

Гинекологический осмотр, или влагалищное исследование. Обследование, в ходе которого врач проверяет матку, влагалище, яичники и прямую кишку для выявления необычных изменений.

Дилатация и кюретаж. Процедура взятия небольшого кусочка тканей из матки для исследования.

ДО, или длительность ответа. Период времени до возобновления роста или распространения рака у участников исследования с ответом на лечение.

Иммунотерапия. Вид лечения, направленный на стимулирование иммунной системы организма атаковать раковые клетки.

Карбоплатин. Вид химиотерапии, при котором для лечения рака повреждают ДНК клетки.

Кольпоскопия. Процедура оценки клеток шейки матки.

КТ, или компьютерная томография. Визуализирующее исследование, позволяющее увидеть внутренние органы.

Лучевая терапия. Вид лечения рака, при котором для уничтожения раковых клеток используются пучки интенсивной энергии рентгеновских лучей и других источников.

Матка. Небольшой полый грушевидный орган, расположенный в малом тазу, в котором развивается плод.

Важная Информация о Безопасности (продолжение)

Немедленно обратитесь к врачу лично или по телефону, если у Вас появятся какие-либо новые или ухудшатся имеющиеся признаки или симптомы, в том числе:

Проблемы со стороны легких. Признаки и симптомы могут включать кашель, одышку или боль в груди.

Проблемы со стороны кишечника. Признаки и симптомы могут включать диарею или более частую, чем обычно, дефекацию; черный, дегтеобразный, липкий кал или кал с примесью крови или слизи либо сильную боль или болезненные ощущения в области желудка (в животе).

Проблемы со стороны печени. Признаки и симптомы могут включать пожелтение кожи или белков глаз, сильную тошноту или рвоту, боль в правом подреберье (в животе), темную мочу (цвета чая) и кровотечение или появление кровоподтеков при более легких, чем обычно, травмах.

Проблемы со стороны эндокринных желез. Признаки и симптомы могут включать непроходящие или необычные головные боли, повышенную чувствительность глаз к свету, проблемы со зрением, учащенное сердцебиение, повышенную потливость, сильное ощущение усталости, увеличение или снижение массы тела, большее, чем обычно, чувство голода или жажды, более частое, чем обычно, мочеиспускание, выпадение волос, зябкость, запор, огрубение голоса, головокружение или обмороки, изменения в настроении или поведении, такие как снижение полового влечения, раздражительность или забывчивость.

Пожалуйста, полностью ознакомьтесь с дополнительной важной информацией о безопасности, а также с полной [инструкцией по применению](#), включая [руководство по применению лекарственного препарата](#). Эти документы также доступны на сайте JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



Словарь часто встречающихся терминов, касающихся лечения (продолжение)

Медиана. Значение, которое находится ровно по центру набора данных, также называемое средней точкой.

МРТ, или магнитно-резонансная томография. Сканирование, при котором используются радиоволны и сильные магниты для получения подробного изображения внутренних структур организма.

ОВ, или общая выживаемость. Средняя продолжительность жизни пациентов после начала лечения.

Паклитаксел. Вид химиотерапии, который останавливает рост и деление раковых клеток.

Плацебо. Неактивное вещество, внешне напоминающее исследуемый лекарственный препарат.

ПЭТ-сканирование, или позитронно-эмиссионная томография. Визуализирующее исследование, показывающее расположение раковых клеток.

Рак эндометрия. Рак, который начинает расти в ткани, выстилающей матку. Часто проявляется такими симптомами, как аномальные вагинальные кровотечения и боли в области таза.

Распространенный или рецидивировавший рак эндометрия. Рак эндометрия, распространившийся за пределы матки или вернувшийся после лечения. Часто проявляется такими симптомами, как вагинальное кровотечение, снижение аппетита, необъяснимое снижение массы тела или боли в области таза, тазобедренных суставов, живота или спины.

Синдром Линча. Наследственное состояние, повышающее риск развития рака эндометрия.

Ультразвуковое исследование. Использование звуковых волн для создания изображения внутренних органов.

Химиотерапия. Вид лечения рака, который останавливает или замедляет рост раковых клеток путем их уничтожения или предотвращения их деления и размножения.

Важная Информация о Безопасности (продолжение)

Немедленно обратитесь к врачу лично или по телефону, если у Вас появятся какие-либо новые или ухудшатся имеющиеся признаки или симптомы, в том числе (продолжение):

Проблемы со стороны почек. Признаки и симптомы могут включать изменение количества или цвета мочи, кровь в моче, отеки лодыжек или потерю аппетита.

Проблемы со стороны кожи. Признаки и симптомы могут включать сыпь, зуд, образование пузырей на коже или шелушение кожи, припухлость лимфатических узлов, болезненные ранки или язвы во рту, носу, горле или в области половых органов, повышение температуры тела или симптомы, похожие на простуду.

Также могут возникнуть проблемы в других органах и тканях. Это не полный список признаков и симптомов нарушений иммунной системы, которые могут развиваться при применении препарата JEMPERLI. При появлении новых или ухудшении имеющихся признаков или симптомов немедленно обратитесь к врачу лично или по телефону. Признаки и симптомы могут включать боль в груди, нерегулярное сердцебиение, одышку, отечность лодыжек; спутанность сознания, сонливость, проблемы с памятью, изменения в настроении или поведении, скованность шеи, проблемы с равновесием, покалывание или онемение рук или ног; двоение в глазах, помутнение зрения, повышенную чувствительность к свету, боль в глазах, изменения зрения; постоянную или сильную боль или слабость в мышцах, мышечные спазмы; низкий уровень эритроцитов, кровоподтеки.

Пожалуйста, полностью ознакомьтесь с дополнительной важной информацией о безопасности, а также с полной [инструкцией по применению](#), включая [руководство по применению лекарственного препарата](#). Эти документы также доступны на сайте JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



Вам нужны дополнительные ресурсы, которые помогут в ходе лечения? Посетите сайт JEMPERLI.com

Важная информация о безопасности (продолжение)

Инфузионные реакции, которые иногда могут быть тяжелыми или угрожающими жизни. Признаки и симптомы инфузионных реакций могут включать озноб или дрожь, зуд или сыпь, приливы жара, затрудненное или свистящее дыхание, головокружение, предобморочное состояние, повышение температуры тела, боль в спине или шее.

Отторжение трансплантированного органа. Ваш лечащий врач должен объяснить вам, какие признаки и симптомы необходимо отслеживать и сообщать о них, в зависимости от того, трансплантацию какого органа вам выполнили.

Осложнения, включая реакцию «трансплантат против хозяина» (РТПХ), после трансплантации костного мозга (стволовых клеток) с использованием донорских стволовых клеток (аллогенных). Эти осложнения могут быть тяжелыми и могут привести к смерти. Эти осложнения могут возникнуть, если трансплантация была проведена до или после лечения препаратом JEMPERLI. Ваш лечащий врач будет наблюдать за вашим состоянием, чтобы выявить эти осложнения.

Своевременное обращение за медицинской помощью может предотвратить усугубление этих проблем. Ваш лечащий врач проверит, не появились ли у вас эти проблемы во время лечения препаратом JEMPERLI, и может назначить кортикостероиды или гормональные препараты для заместительной терапии. Если у вас возникнут тяжелые побочные эффекты, лечащий врач также может решить приостановить или полностью прекратить лечение препаратом JEMPERLI.

Перед началом лечения препаратом JEMPERLI сообщите своему лечащему врачу обо всех своих проблемах со здоровьем, в том числе о следующем: проблемы с иммунной системой, такие как болезнь Крона, язвенный колит или волчанка; вам выполнили пересадку органа; вам выполнили или запланировали пересадку стволовых клеток от донора (аллогенных); вам проводили лучевую терапию на область грудной клетки; у вас есть состояние, поражающее нервную систему, например тяжелая миастения или синдром Гийена — Барре.

Если вы беременны или планируете забеременеть, сообщите об этом своему лечащему врачу. Препарат JEMPERLI может нанести вред вашему будущему ребенку. Если вы можете забеременеть, до начала лечения вам выполнят тест на беременность. Используйте эффективный способ контрацепции во время лечения и 4 месяца после применения последней дозы препарата JEMPERLI. Сразу же сообщите лечащему врачу, если забеременеете или подумаете, что могли забеременеть, во время лечения препаратом JEMPERLI.

Если вы кормите или планируете кормить ребенка грудью, сообщите об этом своему лечащему врачу. Неизвестно, проникает ли препарат JEMPERLI в грудное молоко. Не кормите грудью во время лечения и 4 месяца после применения последней дозы препарата JEMPERLI.

Назовите лечащему врачу все лекарства, которые вы принимаете, в том числе отпускаемые по рецепту и без рецепта, витамины и добавки из лекарственных трав.

Наиболее частые побочные эффекты препарата JEMPERLI при применении с карбоплатином и паклитакселом: проблемы с нервами рук и ног; ощущение усталости; тошнота; выпадение волос; боль в суставах; сыпь; запор; диарея; боль в области желудка (в животе); одышка; пониженный аппетит; инфекции мочевыводящих путей; рвота.

Наиболее частые побочные эффекты препарата JEMPERLI при применении в режиме монотерапии: ощущение усталости и слабость, низкое количество эритроцитов в крови (анемия), диарея, тошнота, запор, рвота.

Здесь перечислены не все возможные побочные эффекты препарата JEMPERLI. Позвоните врачу, чтобы проконсультироваться в случае возникновения побочных эффектов.

О неблагоприятных побочных эффектах рецептурных лекарственных препаратов сообщайте в FDA по телефону 1-800-FDA-1088 или на сайте www.fda.gov/medwatch.

Ознакомьтесь с полной [инструкцией по применению](#), включая [руководство по применению лекарственного препарата](#), Эти документы также доступны на сайте JEMPERLI.com.

Товарные знаки принадлежат на правах собственности или лицензированы группой компаний GSK.

GSK ©2024 GSK or licensor.
PMUS-DSTBROC240070 December 2024
Produced in USA.

Название файла: Russian Patient Glossary

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg