



Glosario

de términos utilizados con frecuencia en los tratamientos

Cáncer de endometrio avanzado o recidivante: cáncer de endometrio que se ha propagado fuera del útero o que regresa después del tratamiento. Los síntomas frecuentes pueden ser sangrado vaginal, disminución del apetito, pérdida de peso inexplicable o dolor en la pelvis, las caderas, el estómago o la espalda.

Biomarcador: molécula que se encuentra en los tejidos o fluidos corporales y que muestran si una afección, un proceso o una enfermedad es normal o no. Algunos biomarcadores pueden proporcionar información importante sobre el cáncer y pueden ayudar a su médico a decidir qué opciones de tratamiento, incluido JEMPERLI, pueden ser adecuadas para usted.

Biopsia: procedimiento para extirpar una pequeña muestra de tejido para analizarla.

Carboplatino: un tipo de quimioterapia que daña el ADN de las células para tratar el cáncer.

Quimioterapia: un tipo de tratamiento contra el cáncer que detiene o retarda el crecimiento de las células cancerosas matándolas o impidiendo que se dividan y se multipliquen.

Colposcopia: procedimiento para evaluar las células del cuello uterino.

TC o tomografía computarizada: imágenes que muestran los órganos internos.

D y L o dilatación y legrado: procedimiento para extirpar una pequeña muestra del útero para analizarla.

Usos Aprobados

JEMPERLI es un medicamento recetado que se utiliza para tratar a adultas con:

- un tipo de cáncer uterino llamado cáncer de endometrio (CE)
 - JEMPERLI puede utilizarse en combinación con los medicamentos quimioterapéuticos carboplatino y paclitaxel, y, posteriormente, JEMPERLI puede utilizarse solo:
 - cuando el cáncer se ha propagado fuera del útero (avanzado) ◦
 - el cáncer ha regresado.
 - JEMPERLI puede utilizarse solo:
 - cuando una prueba de laboratorio indique que el tumor es deficiente en la reparación de los errores de emparejamiento (dMMR, mismatch repair deficient) y
 - el cáncer ha regresado o se ha propagado (CE avanzado) y
 - cuando ha recibido quimioterapia con platino, y no ha funcionado o ya no funciona y
 - el cáncer no se puede tratar con cirugía ni radiación.

Se desconoce si JEMPERLI es seguro y eficaz en niños.

Información Importante de Seguridad

JEMPERLI es un medicamento que actúa sobre el sistema inmunitario para tratar determinados tipos de cáncer. JEMPERLI puede hacer que su sistema inmunitario ataque los órganos y tejidos normales en cualquier lugar del organismo y puede afectar la forma en que funcionan. En ocasiones, estos problemas pueden resultar graves o poner en peligro la vida y provocar la muerte. Usted puede tener más de uno de estos problemas al mismo tiempo. Estos problemas pueden presentarse en cualquier momento durante el tratamiento o incluso después de haberlo finalizado.

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción Completa](#), incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



Glosario

de términos utilizados con frecuencia en los tratamientos (continuación)

dMMR o deficiente en la reparación de los errores de emparejamiento: describe los tipos de cáncer que tienen un sistema MMR que no funciona correctamente para corregir los errores en los genes. dMMR es un biomarcador importante en el cáncer de endometrio.

DOR o duración de la respuesta: la cantidad de tiempo antes de que el cáncer comenzara a crecer o a propagarse nuevamente en las participantes del estudio que respondieron al tratamiento.

Cáncer de endometrio: cáncer que comienza en el tejido que recubre el útero. Los síntomas frecuentes pueden incluir sangrado vaginal anormal y dolor en la pelvis.

Examen ginecológico o examen pélvico: el médico examina el útero, la vagina, los ovarios y el recto para detectar cualquier hallazgo inusual.

Inmunoterapia: un tipo de tratamiento que está diseñado para trabajar con el sistema inmunitario del cuerpo para atacar las células cancerosas.

IV o intravenosa: recibir un medicamento a través de una vena.

Síndrome de Lynch: enfermedad hereditaria que aumenta el riesgo de cáncer de endometrio.

Mediana: también llamada punto medio, es el número medio de un conjunto de datos.

MMR o reparación de los errores de emparejamiento: el MMR corrige los errores que se producen en los genes durante el crecimiento celular normal.

MMRp o eficiencia en la reparación de errores de emparejamiento: describe los tipos de cáncer que tienen un sistema MMR que funciona correctamente para corregir errores en los genes.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Llame o consulte a su proveedor de atención médica (HCP, healthcare provider) de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o empeoran los existentes, incluidos los siguientes:

Problemas pulmonares. Los signos y síntomas pueden incluir tos, falta de aliento o dolor en el pecho.

Problemas intestinales. Los signos y síntomas pueden incluir diarrea o más deposiciones que de costumbre; heces negras, alquitranadas, pegajosas o con sangre o mucosidad; o sensibilidad o dolor intenso en el área del vientre (abdomen).

Problemas hepáticos. Los signos y síntomas pueden incluir piel o parte blanca de los ojos amarillentas, náuseas o vómitos intensos, dolor en el lado derecho del área del vientre (abdomen), orina oscura (como el té) o aparición de sangrado o moretones con mayor facilidad que la habitual.

Problemas con las glándulas hormonales. Los signos y síntomas pueden incluir dolor de cabeza inusual o que no desaparece, sensibilidad ocular a la luz, problemas oculares, latidos cardíacos rápidos, aumento de la sudoración, cansancio extremo, aumento o pérdida de peso, más hambre o sed de lo habitual, orinar con más frecuencia de la habitual, caída de cabello, sensación de frío, estreñimiento, voz más grave, mareo o desmayo, cambios de humor o comportamiento, como disminución del deseo sexual; irritabilidad o tendencia al olvido.

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción Completa](#), incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



Glosario

de términos utilizados con frecuencia en los tratamientos (continuación)

RMN o imágenes por resonancia magnética: exploraciones que utilizan ondas de radio e imanes potentes para proporcionar una imagen detallada del interior del cuerpo.

MSI-H o alta inestabilidad de microsatélites: describe genes inestables en algunos tumores que se pueden presentar porque el sistema MMR no repara los errores de forma adecuada. MSI-H es un biomarcador importante en el cáncer de endometrio.

MSS o estabilidad de microsatélites: describe los tipos de cáncer que tienen genes estables debido a que el sistema MMR funciona correctamente para corregir errores en los genes.

SG o supervivencia general: el tiempo promedio de vida de las pacientes tras el inicio del tratamiento.

Paclitaxel: un tipo de quimioterapia que impide que las células cancerosas crezcan y se dividan.

TEP o tomografía por emisión de positrones: imágenes que muestran la ubicación de las células cancerosas.

SLP o supervivencia libre de progresión: se refiere al tiempo sin que el cáncer creciera, se propagara o empeorara en las participantes del estudio.

Placebo: sustancia inactiva diseñada para parecerse al medicamento que se está evaluando.

Radioterapia: un tipo de tratamiento contra el cáncer que utiliza haces de energía intensa procedentes de rayos X y otras fuentes para destruir las células cancerosas.

Ecografía: utiliza ondas sonoras para crear una imagen de sus órganos internos.

Útero o matriz: órgano pequeño, hueco y con forma de pera que se encuentra en la pelvis y en el que se desarrolla el feto.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Llame o consulte a su proveedor de atención médica (HCP) de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o empeoran los existentes, incluidos los siguientes (continuación):

Problemas renales. Los signos y síntomas pueden incluir cambios en la cantidad o el color de la orina, sangre en la orina, hinchazón de tobillos o pérdida de apetito.

Problemas cutáneos. Los signos y síntomas pueden incluir sarpullido, picazón, formación de ampollas o descamación de la piel, inflamación de los ganglios linfáticos, llagas o úlceras dolorosas en la boca, la nariz, la garganta o la zona genital; fiebre o síntomas de tipo gripal.

También pueden producirse problemas en otros órganos y tejidos. Estos no son todos los signos y síntomas de problemas del sistema inmunitario que pueden aparecer con JEMPERLI. Llame o consulte a su HCP de inmediato si aparece algún signo o síntoma nuevo o que empeore. Los signos y síntomas pueden incluir dolor en el pecho, latidos cardíacos irregulares, falta de aliento, hinchazón de tobillos, confusión, tendencia al sueño, problemas de memoria, cambios de humor o comportamiento, cuello rígido, problemas de equilibrio, sensación de hormigueo o entumecimiento de brazos o piernas, visión doble, visión borrosa, sensibilidad a la luz, dolor de los ojos, cambios en la visión, dolor o debilidad muscular constantes o intensos, calambres musculares, recuento bajo de glóbulos rojos, moretones.

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción Completa](#), incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



¿Quiere más recursos que puedan ayudarla en su proceso de tratamiento? Visite [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com)

Información Importante de Seguridad (continuación)

Reacciones a la infusión que, a veces, pueden ser graves o potencialmente mortales. Los signos y síntomas de reacciones a la infusión pueden incluir escalofríos o temblores, picazón o sarpullido, rubefacción, falta de aliento o sibilancia, mareo, sensación de desmayo, fiebre, dolor de espalda o cuello.

Rechazo de un órgano trasplantado. Su HCP debe indicarle qué signos y síntomas debe notificar, y deberá vigilarla, según el tipo de trasplante de órgano que haya recibido.

Complicaciones, incluida la enfermedad del injerto contra el huésped (EICH), en personas que han recibido un trasplante de médula ósea (células madre) en el que se utilizan células madre de un donante (allogénico). Estas complicaciones pueden ser graves y causar la muerte. Estas complicaciones se pueden producir si se sometió a un trasplante antes o después de recibir tratamiento con JEMPERLI. Su HCP la vigilará para detectar estas complicaciones.

Si recibe tratamiento médico de inmediato podría evitar que estos problemas se agraven. Su HCP la examinará para detectar estos problemas durante el tratamiento con JEMPERLI y podrá administrarle corticosteroides o medicamentos de reemplazo hormonal. Si tiene efectos secundarios graves, es posible que su HCP también deba retrasar o suspender de forma definitiva el tratamiento con JEMPERLI.

Antes de recibir JEMPERLI, informe a su HCP sobre todas sus afecciones médicas, como, por ejemplo, problemas del sistema inmunitario, como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o lupus; si ha recibido un trasplante de órgano; si ha recibido o tiene previsto recibir un trasplante de células madre de un donante (allogénico); si ha recibido radioterapia en la zona torácica; si padece alguna enfermedad que afecte al sistema nervioso, como miastenia grave o síndrome de Guillain-Barré.

Si está embarazada o planea quedar embarazada, infórmelo a su HCP. JEMPERLI puede dañar al feto. Si puede quedar embarazada, su HCP le realizará una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento. Utilice un método anticonceptivo eficaz durante su tratamiento y durante los 4 meses siguientes a la última dosis de JEMPERLI. Si queda embarazada durante su tratamiento con JEMPERLI o si cree que podría estar embarazada, infórmelo de inmediato a su HCP.

Si está amamantando o planea amamantar, infórmelo a su HCP. Se desconoce si JEMPERLI pasa a través de la leche materna. No amamante durante el tratamiento con JEMPERLI y durante 4 meses después de su última dosis.

Infórmele a su HCP sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

Los efectos secundarios más frecuentes de JEMPERLI cuando se administra con carboplatino y paclitaxel incluyen problemas nerviosos en los brazos, las manos, las piernas y los pies; cansancio; náuseas; caída del cabello; dolor articular; sarpullido; estreñimiento; diarrea; dolor en el área del vientre (abdomen); falta de aliento; disminución del apetito; infecciones de las vías urinarias; vómitos.

Los efectos secundarios más frecuentes de JEMPERLI cuando se usa solo son cansancio y debilidad, recuento bajo de glóbulos rojos (anemia), diarrea, náuseas, estreñimiento y vómitos.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de JEMPERLI. Comuníquese con su médico para recibir asesoramiento sobre los efectos secundarios.

Se recomienda notificar los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Para ello, llame al 1-800-FDA-1088 o visite www.fda.gov/medwatch.

Consulte la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com).

Las marcas comerciales son propiedad del grupo de empresas de GSK o se usan conforme a una licencia otorgada al grupo de empresas de GSK.



©2024 GSK or licensor.
PMUS-DSTBROC240042 October 2024
Produced in USA.

Nombre del archivo: Spanish Patient Glossary

