



JEMPERLI와 관련된 잠재적 부작용을 이해하기 위한 가이드*

*이 정보는 귀하의 의료서비스 제공자의 조언을 대체할 수 없습니다. 우려사항이나 질문이 있으시면 반드시 담당 의사에게 문의하십시오.

실제로 JEMPERLI를 투여하는 환자는 아님

문서 전반에 걸쳐 중요 안전성 정보와 **투약 지침**을 포함한 전체 **처방 정보**는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



목차

JEMPERLI를 사용하면 부작용을 경험할 수도 있습니다	4	JEMPERLI + 카보플라틴 및 파클리탁셀(CP)과 관련된 잠재적 부작용	11
JEMPERLI 단독 투여와 관련된 잠재적 부작용	7		

승인된 용도

JEMPERLI는 성인에서 다음과 같은 질환을 치료하는 데 사용되는 처방약입니다.

- 자궁내막암(endometrial cancer, EC)이라 불리는 자궁암의 한 유형
 - JEMPERLI는 화학요법 약물인 카보플라틴 및 파클리탁셀과 함께 사용할 수 있고, 이후 다음의 경우에 JEMPERLI를 단독으로 사용할 수 있습니다.
 - 암이 자궁 밖으로 전이된 경우(진행성) 또는,
 - 암이 재발한 경우.
 - JEMPERLI는 다음의 경우 단독으로 사용할 수 있습니다.
 - 실험실 검사에서 종양이 불일치 복구 결핍(mismatch repair deficient, dMMR)인 것으로 나타나는 경우, **그리고**
 - 암이 재발했거나 퍼진 경우(진행성 EC), **그리고**
 - 귀하가 백금 함유 화학요법을 받았으며 이 요법이 효과가 없었거나 더 이상 효과가 없는 경우, **그리고**
 - 귀하의 암이 수술이나 방사선으로 치료할 수 없는 경우.

JEMPERLI가 소아에서 안전하고 효과적인지 여부는 알려지지 않았습니다.

중요한 안전성 정보

JEMPERLI는 면역계와 함께 작용하여 특정 암을 치료할 수 있는 약물입니다. JEMPERLI는 면역계가 신체 어느 부위이든 정상 장기와 조직을 공격하게 만들어 그 작용 방식에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 문제는 때로 중증이 되거나 생명을 위협할 수 있으며, 사망에 이를 수도 있습니다. 이러한 문제는 여러 가지가 동시에 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 치료 중 언제든지 발생할 수 있으며, 치료가 끝난 후에도 발생할 수 있습니다.

문서 전반에 걸쳐 중요 안전성 정보와 **투약 지침**을 포함한 전체 **처방 정보**는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg





실제로 JEMPERLI를 투여하는 환자는 아님

중요한 안전성 정보(계속)

다음에 포함하여 새로운 징후 또는 증상이 발생하거나 징후 또는 증상이 악화되는 경우 즉시 의료 서비스 공급자(healthcare provider, HCP)에게 전화하거나 진료를 받으십시오.

폐 문제. 징후와 증상은 기침, 숨참, 흉통을 포함할 수 있습니다.

장 문제. 징후와 증상은 설사 또는 평소보다 더 잦은 배변; 검은 타르 같은 끈적한 변 또는 혈액이나 점액이 있는 변; 중증의 위장 부위(복부) 통증 또는 압통을 포함할 수 있습니다.

간 문제. 징후와 증상은 피부 또는 눈의 흰자가 노랗게 변함, 중증 오심 또는 구토, 오른쪽 위 부위(복부) 통증, 진한색 소변(차색), 또는 평소보다 쉽게 출혈이나 멍이 생김 등을 포함할 수 있습니다.

문서 전반에 걸쳐 중요 안전성 정보와 **투약 지침**을 포함한 전체 **처방 정보**는 [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com)에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

JEMPERLI를 사용하면 부작용을 경험할 수도 있습니다

JEMPERLI는 면역계와 함께 작용하여 특정 암을 치료할 수 있는 약물입니다. JEMPERLI는 면역계가 신체 어느 부위이든 정상 장기와 조직을 공격하게 만들어 그 작용 방식에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 문제는 때로 중증이 되거나 생명을 위협할 수 있으며, 사망에 이를 수도 있습니다. 이러한 문제는 여러 가지가 동시에 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 치료 중 언제든지 발생할 수 있으며, 치료가 끝난 후에도 발생할 수 있습니다.

다음은 포함하여 새로운 징후 또는 증상이 발생하거나 징후 또는 증상이 악화되는 경우 즉시 의료서비스 제공자에게 전화하거나 진료를 받으십시오.

면역 체계 문제

- 폐 문제, 기침 또는 숨참 등
- 장 문제, 설사 또는 평소보다 배변 횟수가 많거나, 심한 복부 통증이나 압통 등
- 간 문제, 피부 또는 눈의 흰자가 노랗게 변함 등
- 호르몬샘 문제, 즉 사라지지 않는 두통이나 비정상적인 두통, 빛에 대한 눈의 민감성 등
- 신장 문제, 발목이 부어 오르거나 소변에 혈액이 섞여 나옴 등
- 피부 문제, 발진이나 가려움증 등
- 다른 기관 및 조직의 문제, 증상으로는 흉통, 지속적이거나 중증 근육통이나 근육 약화, 복시 등

기타 문제들

- 때로는 중증이거나 생명을 위협할 수 있는 주입 반응, 오한이나 떨림, 현기증, 숨참 또는 천명음 등의 증상 초래 가능
- 이식 기관 거부
- 기증자 줄기세포를 사용하는 골수(줄기세포) 이식(이종 이식)을 받은 사람의 경우 이식편대숙주병(graft-versus-host-disease, GVHD)을 포함한 합병증



여기에 JEMPERLI로 발생할 수 있는 모든 징후와 증상을 나열한 것은 아닙니다. **자세한 내용은 의사와 상담하십시오.**

문서 전반에 걸쳐 중요 안전성 정보와 **투약 지침**을 포함한 전체 **처방 정보**는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

JEMPERLI를 사용하면 부작용을 경험할 수도 있습니다(계속)

즉시 치료를 받으면 이전 페이지의 문제가 더 중대해지는 것을 막는 데 도움이 될 수 있습니다.

- 귀하의 의료서비스 제공자는 JEMPERLI 치료 중 이러한 문제에 대해 귀하를 확인할 것입니다
- 특정 부작용이 있는 경우 의료서비스 제공자가 코르티코스테로이드 또는 호르몬 대체 약물을 사용하여 치료할 수도 있습니다
- 중증 부작용이 나타날 경우, 의료서비스 제공자는 JEMPERLI 치료를 지연하거나 완전히 중단해야 할 수도 있습니다

JEMPERLI + 카보플라틴 및 파클리탁셀(CP)을 투여받는 연구 참여자에서:

- 19%는 부작용으로 인해 JEMPERLI 투여를 완전히 중단했습니다
- 37%는 부작용으로 인해 치료가 중단되었습니다

JEMPERLI를 단독으로 투여 받은 연구 참여자들 중:

- 10%는 부작용으로 인해 JEMPERLI 투여를 완전히 중단했습니다
- 28%는 부작용으로 인해 치료가 중단되었습니다

중요한 안전성 정보(계속)

다음은 포함하여 새로운 징후 또는 증상이 발생하거나 징후 또는 증상이 악화되는 경우 즉시 의료 서비스 공급자(healthcare provider, HCP)에게 전화하거나 진료를 받으십시오(계속):

호르몬 분비선 문제. 징후와 증상은 사라지지 않는 두통 또는 비정상적인 두통, 빛에 대한 눈 민감성, 눈 문제, 빠른 심박동, 발한 증가, 극심한 피로, 체중 증가 또는 감소, 평소보다 더 배고픔 또는 갈증을 느낌, 평소보다 더 잦은 배뇨, 탈모, 추운 느낌, 변비, 목소리가 더 굵어짐, 어지러움 또는 실신, 성욕 감소, 예민함 또는 건망증과 같은 기분이나 행동의 변화를 포함할 수 있습니다.

신장 문제. 징후와 증상은 소변의 양이나 색의 변화, 소변 내 혈액, 발목 부종 또는 식욕 상실을 포함할 수 있습니다.

피부 문제. 징후와 증상은 발진; 가려움; 피부 물집 또는 벗겨짐; 림프절 부종; 구강 또는 코, 인후 또는 생식기 부위의 통증성 상처 또는 궤양; 발열 또는 독감 유사 증상을 포함할 수 있습니다.

문서 전반에 걸쳐 중요 안전성 정보와 [투약 지침](#)을 포함한 전체 [처방 정보](#)는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

JEMPERLI를 사용하면 부작용을 경험할 수도 있습니다(계속)

JEMPERLI+CP의 가장 흔한 부작용으로는 팔, 손, 다리, 발의 신경 문제; 피로; 오심; 탈모; 관절통; 발진; 변비; 설사; 위 부위(복부) 통증; 숨참; 식욕 감소; 요로 감염; 구토가 있습니다.

단독으로 투여된 JEMPERLI의 가장 흔한 부작용으로는 피로 및 쇠약, 낮은 적혈구 수(빈혈), 설사, 오심, 변비, 구토가 있습니다.



부작용에 대해 주의하고 부작용이 발생하는 경우

담당 의사와 상의하십시오. 이러한 증상은 더 중대하거나 생명을 위협하는 다른 문제의 징후일 수도 있습니다.

부작용에 대해 자세히 알아보시려면 [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com)을 방문하십시오.

중요한 안전성 정보(계속)

문제는 다른 기관 및 조직에서도 발생할 수 있습니다. 이 문제들은 JEMPERLI로 발생할 수 있는 면역계 문제의 모든 징후와 증상은 아닙니다. 새로운 또는 악화되는 징후나 증상에 대해 즉시 HCP에게 전화하거나 진료를 받으십시오. 징후와 증상은 흉통, 불규칙한 심박동, 숨참, 발목 부종; 혼동, 졸림, 기억력 문제, 기분이나 행동의 변화, 목의 경직, 균형 문제, 팔다리의 저림 또는 마비; 복시, 흐릿한 시야, 빛에 대한 민감성, 눈의 통증, 시력 변화; 지속적인 또는 중증의 근육 통증 또는 쇠약, 근육 경련; 낮은 적혈구, 멍을 포함할 수 있습니다.

때때로 중증이 되거나 생명을 위협할 수 있는 주입 반응. 주입 반응의 징후와 증상은 오한 또는 떨림, 가려움 또는 발진, 홍조, 숨참 또는 쉼쉼거림, 어지러움, 기절할 것 같은 느낌, 발열, 등 또는 목 통증을 포함할 수 있습니다.

문서 전반에 걸쳐 중요 안전성 정보와 [투약 지침](#)을 포함한 전체 [처방 정보](#)는 [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com)에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

JEMPERLI 단독 투여와 관련된 잠재적 부작용



사람마다 치료 경험은 모두 다릅니다. 부작용이 처음 나타나거나, 어떤 방식으로든 부작용이 악화되는 경우 의사와 상의하는 것이 중요합니다. JEMPERLI의 부작용이 여기에 모두 나열된 것은 아니지만, 의료진이 특정 부작용에 대해 제안할 수 있는 팁에 대한 자세한 정보는 아래를 참조하십시오. **부작용이 나타날 경우 반드시 담당 의료서비스 제공자에게 알리고 지시를 따르십시오.**



부작용에 대해 주의하고 부작용이 발생하는 경우 담당 의사와 상의하십시오. 이러한 증상은 더 중대하거나 생명을 위협하는 다른 문제의 징후일 수도 있습니다. 이 브로셔에 나와 있는 부작용은 JEMPERLI 사용 시 발생할 수 있는 모든 부작용은 아닙니다. 이 브로셔에 나열된 팁은 이러한 부작용을 해결하는 데 도움이 된다는 것이 입증되지 않았습니니다.

피로 및 쇠약

피로와 쇠약에 대처하기 위한 권장 사항에 대해 케어팀과 상의하십시오. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 가장 중요한 일을 우선 순위로 정하고 하루 전체 걸쳐 활동을 분산하여 하루를 계획합니다
- 긴 낮잠 한 번보다는 휴식 시간이나 짧은 낮잠을 자도록 합니다
- 본인에게 적합한 운동 프로그램을 계획합니다
- 매일 밤 7~8시간의 수면을 목표로 합니다
- 카페인과 저녁 운동 등 수면을 방해하는 일을 피합니다

중요한 안전성 정보(계속)

이식 기관 거부. 귀하의 HCP는 귀하가 받은 기관 이식의 유형에 따라 귀하가 어떤 징후와 증상을 보고해야 하는지 알려줄 것이며 귀하를 모니터링할 것입니다.

기증자 줄기세포를 사용하는 골수(줄기세포) 이식(이종 이식)을 받은 사람의 경우 이식편대숙주병(graft-versus-host-disease, GVHD)을 포함한 합병증. 이러한 합병증은 중대할 수 있으며 사망에 이를 수도 있습니다. 이러한 합병증은 JEMPERLI로 치료하기 전이나 후에 이식을 받은 경우 발생할 수 있습니다. 귀하의 HCP는 이러한 합병증에 대해 귀하를 모니터링할 것입니다.

문서 전반에 걸쳐 중요 안전성 정보와 **투약 지침**을 포함한 전체 **처방 정보**는 [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com)에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

JEMPERLI 단독 투여와 관련된 잠재적 부작용(계속)



케어팀을 믿으십시오. 케어팀은 여러분의 감정을 이해하고 도움이 될 수 있는 리소스를 가지고 있습니다.

설사

설사에 대처하기 위한 권장 사항에 대해 케어팀과 상의하십시오. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 튀긴 음식 및 콩과 통곡물과 같은 섬유질이 풍부한 음식을 피합니다
- 알코올이나 담배의 사용을 줄입니다
- 처방전 또는 일반의약품으로 구입할 수 있는 설사 치료제를 투여하는 경우, 지시에 따라 투여합니다



부작용에 대해 주의하고 부작용이 발생하는 경우 담당 의사와 상의하십시오. 이러한 증상은 더 중대하거나 생명을 위협하는 다른 문제의 징후일 수도 있습니다. 이것들이 JEMPERLI에서 발생할 수 있는 모든 부작용은 아닙니다. 이러한 팁은 이 브로셔에 열거된 부작용들에 도움이 된다는 것이 입증되지 않았습니다.

중요한 안전성 정보(계속)

즉시 치료를 받으면 이러한 문제가 더 중대해지는 것을 막는 데 도움이 될 수 있습니다. 귀하의 HCP는 JEMPERLI 치료 기간 동안 귀하에게 이러한 문제가 있는지 확인할 것이며 코르티코스테로이드나 호르몬 대체 약물을 사용하여 귀하를 치료할 수도 있습니다. 중증 부작용이 나타날 경우, 귀하의 HCP는 JEMPERLI 치료를 지연하거나 완전히 중단해야 할 수도 있습니다.

문서 전반에 걸쳐 중요 안전성 정보와 **투약 지침**을 포함한 전체 **처방 정보**는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



실제로 JEMPERLI를 투여하는 환자는 아님

JEMPERLI 단독 투여와 관련된 잠재적 부작용(계속)

메스꺼움

메스꺼움에 대처하기 위한 권장 사항에 대해 케어팀과 상의하십시오. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 식사나 간식을 건너뛰지 않도록 노력하십시오. 공복은 메스꺼움을 더 심화시킬 수 있습니다
- 마른 토스트, 크래커 및 기타 순한 맛의 음식을 준비해 둡니다
- 기름진 음식, 튀긴 음식, 매운 음식 또는 매우 달콤한 음식을 피합니다
- 하루 종일 천천히 수분을 섭취합니다
- 처방전 또는 일반의약품으로 구입할 수 있는 메스꺼움 치료제를 투여하는 경우, 지시에 따라 투여합니다
- 박하와 같은 아로마 요법을 시도합니다



부작용에 대해 주의하고 부작용이 발생하는 경우 담당 의사와 상의하십시오. 이러한 증상은 더 중대하거나 생명을 위협하는 다른 문제의 징후일 수도 있습니다. 이것들이 JEMPERLI에서 발생할 수 있는 모든 부작용은 아닙니다. 이러한 팁은 이 브로셔에 열거된 부작용들에 도움이 된다는 것이 입증되지 않았습니다.

중요한 안전성 정보(계속)

JEMPERLI를 투여받기 전에, 귀하의 HCP에게 귀하의 모든 의학적 상태에 대해 알려십시오. 여기에는 크론병, 궤양성 대장염 또는 루푸스와 같은 면역계 문제; 기관 이식을 받았는지 여부; 기증자 줄기세포 (이종 이식)를 사용하는 줄기세포 이식을 받았는지 여부 또는 그러한 계획; 흉부 부위에 방사선 치료를 받았는지 여부; 중증 근무력증이나 길랑-바레 증후군과 같이 신경계에 영향을 미치는 상태의 존재 여부가 포함됩니다.

문서 전반에 걸쳐 중요 안전성 정보와 **투약 지침**을 포함한 전체 **처방 정보**는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

JEMPERLI 단독 투여와 관련된 잠재적 부작용(계속)

변비

변비 관리를 위한 권장 사항에 대해 케어팀과 상의하십시오. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 신선한 과일과 채소, 귀리, 통밀빵, 현미 등 섬유질이 풍부한 음식을 더 많이 섭취하려고 노력합니다
- 충분한 양의 수분을 섭취하되, 얼마나 많은 양의 수분을 섭취해도 안전한지 의료진에게 반드시 물어보십시오
- 본인에게 적합한 운동 계획을 통해 최대한 활동적으로 지냅니다
- 처방전 또는 일반의약품으로 구입할 수 있는 변비 치료제를 투여하는 경우, 지시에 따라 투여합니다

구토

구토에 대처하기 위한 권장 사항에 대해 케어팀과 상의하십시오. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 강렬하거나 불쾌한 냄새가 나는 음식은 피합니다
- 더 마시고 기분이 좋아질 수 있을 만큼 천천히 수분을 섭취합니다
- 수분 공급을 유지하는 방법과 얼마나 많은 물을 마셔도 안전한지에 대해 케어팀과 상의하십시오



부작용에 대해 주의하고 부작용이 발생하는 경우 담당 의사와 상의하십시오. 이러한 증상은 더 중대하거나 생명을 위협하는 다른 문제의 징후일 수도 있습니다. 이것들이 JEMPERLI에서 발생할 수 있는 모든 부작용은 아닙니다. 이러한 팁은 이 브로셔에 열거된 부작용들에 도움이 된다는 것이 입증되지 않았습니다.

중요한 안전성 정보(계속)

현재 임신 중이거나 임신을 계획하고 있다면 HCP에게 알려십시오. JEMPERLI는 태아에게 해를 끼칠 수 있습니다. 임신이 가능한 경우, 치료를 시작하기 전에 HCP가 임신검사를 실시할 것입니다. 치료 기간 중 및 JEMPERLI 마지막 용량 후 4개월 동안 효과적인 피임법을 사용하십시오. JEMPERLI 치료 중 임신하게 되거나 임신했다고 생각되는 경우 HCP에게 즉시 알려십시오.

현재 모유 수유 중이거나 모유 수유를 계획하고 있다면 HCP에게 알려십시오. JEMPERLI가 모유로 전달되는지 여부는 알려지지 않았습니다. JEMPERLI 치료 중 및 마지막 용량 후 4개월 동안 모유 수유를 하지 마십시오.

문서 전반에 걸쳐 중요 안전성 정보와 **투약 지침**을 포함한 전체 **처방 정보**는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

JEMPERLI + CP 투여와 관련된 잠재적 부작용



사람마다 치료 경험은 모두 다릅니다. 그렇기 때문에 부작용이 처음 나타나거나, 어떤 방식으로든 부작용이 악화되는 경우 의사와 상의하는 것이 중요합니다. JEMPERLI의 부작용이 여기에 모두 나열된 것은 아니지만, 의료진이 특정 부작용에 대해 제안할 수 있는 팁에 대한 자세한 정보는 아래를 참조하십시오. **부작용이 나타날 경우 반드시 담당 의료서비스 제공자에게 알리고 지시를 따르십시오.**

팔, 손, 다리, 발의 신경 문제

신경 문제에 대처하기 위한 권장 사항에 대해 케어팀과 상의하십시오. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 손과 발을 정기적으로 검사하여 부상, 상처 또는 염증이 없는지 확인합니다
- 알코올을 피하거나 제한합니다
- 가벼운 스트레칭과 균형을 잡는 운동을 합니다
- 추울 때는 신발과 따뜻한 옷을 입고, 요리할 때는 열로부터 손을 보호하는 등 극한 기온으로부터 손과 발을 보호합니다
- 지나다니는 길에서 카펫을 치우고 벽과 욕실에 난간을 설치하여 넘어짐을 방지합니다
- 특히 현기증을 느낄 경우 앉거나 누워서 천천히 일어납니다
- 처방전 또는 일반의약품으로 구입할 수 있는 패치나 크림 등 통증 치료제를 투여하는 경우, 지시에 따라 투여합니다



부작용에 대해 주의하고 부작용이 발생하는 경우 담당 의사와 상의하십시오. 이러한 증상은 더 중대하거나 생명을 위협하는 다른 문제의 징후일 수도 있습니다. 이 브로셔에 나와 있는 부작용은 JEMPERLI 사용 시 발생할 수 있는 모든 부작용은 아닙니다. 이 브로셔에 나열된 팁은 이러한 부작용을 해결하는 데 도움이 된다는 것이 입증되지 않았습니.

중요한 안전성 정보(계속)

귀하가 투여하는 모든 약물 **에 대해 HCP에게 알려십시오.** 여기에는 처방약 및 비처방약, 비타민, 생약 보조제 등이 포함됩니다.

문서 전반에 걸쳐 중요 안전성 정보와 **투약 지침**을 포함한 전체 **처방 정보**는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

JEMPERLI + CP 투여와 관련된 잠재적 부작용(계속)

피로

피로에 대처하기 위한 권장 사항에 대해 케어팀과 상의하십시오. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 가장 중요한 일을 우선 순위로 정하고 하루 전체 걸쳐 활동을 분산하여 하루를 계획합니다
- 긴 낮잠 한 번보다는 휴식 시간이나 짧은 낮잠을 자도록 합니다
- 본인에게 적합한 운동 프로그램을 계획합니다
- 매일 밤 7~8시간의 수면을 목표로 합니다
- 카페인과 저녁 운동 등 수면을 방해하는 일을 피합니다

메스꺼움

메스꺼움에 대처하기 위한 권장 사항에 대해 케어팀과 상의하십시오. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 식사나 간식을 건너뛰지 않도록 노력하십시오. 공복은 메스꺼움을 더 심화시킬 수 있습니다
- 마른 토스트, 크래커 및 기타 순한 맛의 음식을 준비해 둡니다
- 기름진 음식, 튀긴 음식, 매운 음식 또는 매우 달콤한 음식을 피합니다
- 하루 종일 천천히 수분을 섭취합니다
- 처방전 또는 일반의약품으로 구입할 수 있는 메스꺼움 치료제를 투여하는 경우, 지시에 따라 투여합니다
- 박하와 같은 아로마 요법을 시도합니다



부작용에 대해 주의하고 부작용이 발생하는 경우 담당 의사와 상의하십시오. 이러한 증상은 더 중대하거나 생명을 위협하는 다른 문제의 징후일 수도 있습니다. 이것들이 JEMPERLI에서 발생할 수 있는 모든 부작용은 아닙니다. 이러한 팁은 이 브로셔에 열거된 부작용들에 도움이 된다는 것이 입증되지 않았습니다.

중요한 안전성 정보(계속)

카보플라틴 및 파클리탁셀과 병용되는 JEMPERLI의 가장 흔한 부작용으로는 팔, 손, 다리, 발의 신경 문제; 피로; 오심; 탈모; 관절통; 발진; 변비; 설사; 위 부위(복부) 통증; 숨참; 식욕 감소; 요로 감염; 구토가 있습니다.

문서 전반에 걸쳐 중요 안전성 정보와 **투약 지침**을 포함한 전체 **처방 정보**는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

JEMPERLI + CP 투여와 관련된 잠재적 부작용(계속)

탈모

탈모에 대처하기 위한 권장 사항에 대해 케어팀과 상의하십시오. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 탈모 가능성과 탈모가 시작되는 시기를 판단합니다
- 탈모로 심란한 것은 자연스러운 일이며, 탈모가 시작되기 전에 머리를 짧게 자르거나 면도하는 사람들이 있다는 것을 인정합니다
- 가발, 스카프, 모자를 시도하여 본인에게 맞는 옵션을 찾습니다

관절통

관절통에 대처하기 위한 권장 사항에 대해 케어팀과 상의하십시오. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 통증이 있는 부위에 차가운 찜질이나 얼음팩 또는 냉동 야채팩을 15~20분씩 매일 몇 번씩 올려줍니다
- 근육을 이완하고 혈류를 증가시키기 위해 온열 패드를 사용하거나 따뜻한 욕조에 담그거나 따뜻한 물로 샤워를 합니다
- 근육 긴장을 완화하는 부드러운 스트레칭 운동을 가르쳐 줄 수 있는 물리치료사를 방문합니다
- 처방전 또는 일반의약품으로 구입할 수 있는 통증 치료제를 투여하는 경우, 지시에 따라 투여합니다



부작용에 대해 주의하고 부작용이 발생하는 경우 담당 의사와 상의하십시오. 이러한 증상은 더 중대하거나 생명을 위협하는 다른 문제의 징후일 수도 있습니다. 이것들이 JEMPERLI에서 발생할 수 있는 모든 부작용은 아닙니다. 이러한 팁은 이 브로셔에 열거된 부작용들에 도움이 된다는 것이 입증되지 않았습니다.

중요한 안전성 정보(계속)

단독으로 사용되는 JEMPERLI의 가장 흔한 부작용으로는 피로 및 쇠약, 낮은 적혈구 수(빈혈), 설사, 오심, 변비, 구토가 있습니다.

이것이 발생 가능한 모든 JEMPERLI의 부작용은 아닙니다. 부작용에 대한 의학적 조언을 받으려면 의사에게 연락하십시오.

처방약의 부작용은 1-800-FDA-1088번으로 전화하거나 www.fda.gov/medwatch를 방문하여 FDA에 보고할 것을 권장합니다.

문서 전반에 걸쳐 중요 안전성 정보와 **투약 지침**을 포함한 전체 **처방 정보**는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



JEMPERLI + CP 투여와 관련된 잠재적 부작용(계속)

발진

발진에 대처하기 위한 권장 사항에 대해 케어팀과 상의하십시오. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 순한 로션과 보습제를 사용합니다
- 가능한 한 햇빛을 피합니다
- 순한 비누와 부드러운 천을 사용하여 해당 부위를 부드럽게 닦습니다
- 처방전 또는 일반의약품으로 구입할 수 있는 발진 치료제를 투여하는 경우, 지시에 따라 투여합니다
- 해당 부위를 더위와 추위로부터 보호합니다



부작용에 대해 주의하고 부작용이 발생하는 경우 담당 의사와 상의하십시오. 이러한 증상은 더 중대하거나 생명을 위협하는 다른 문제의 징후일 수도 있습니다. 이것들이 JEMPERLI에서 발생할 수 있는 모든 부작용은 아닙니다. 이러한 팁은 이 브로셔에 열거된 부작용들에 도움이 된다는 것이 입증되지 않았습니다.

중요한 안전성 정보

JEMPERLI는 면역계와 함께 작용하여 특정 암을 치료할 수 있는 약물입니다. JEMPERLI는 면역계가 신체 어느 부위이든 정상 장기와 조직을 공격하게 만들어 그 작용 방식에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 문제는 때로 중증이 되거나 생명을 위협할 수 있으며, 사망에 이를 수도 있습니다. 이러한 문제는 여러 가지가 동시에 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 치료 중 언제든지 발생할 수 있으며, 치료가 끝난 후에도 발생할 수 있습니다.

문서 전반에 걸쳐 중요 안전성 정보와 **투약 지침**을 포함한 전체 **처방 정보**는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

JEMPERLI + CP 투여와 관련된 잠재적 부작용(계속)

변비

변비에 대처하기 위한 권장 사항에 대해 케어팀과 상의하십시오. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 신선한 과일과 채소, 귀리, 통밀빵, 현미 등 섬유질이 풍부한 음식을 더 많이 섭취하려고 노력합니다
- 충분한 양의 수분을 섭취하되, 얼마나 많은 양의 수분을 섭취해도 안전한지 의료진에게 반드시 물어보십시오
- 본인에게 적합한 운동 계획을 통해 최대한 활동적으로 지냅니다
- 처방전 또는 일반의약품으로 구입할 수 있는 변비 치료제를 투여하는 경우, 지시에 따라 투여합니다

설사

설사에 대처하기 위한 권장 사항에 대해 케어팀과 상의하십시오. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 튀긴 음식 및 콩과 통곡물과 같은 섬유질이 풍부한 음식을 피합니다
- 알코올이나 담배의 사용을 줄입니다
- 처방전 또는 일반의약품으로 구입할 수 있는 설사 치료제를 투여하는 경우, 지시에 따라 투여합니다



부작용에 대해 주의하고 부작용이 발생하는 경우 담당 의사와 상의하십시오. 이러한 증상은 더 중대하거나 생명을 위협하는 다른 문제의 징후일 수도 있습니다. 이것들이 JEMPERLI에서 발생할 수 있는 모든 부작용은 아닙니다. 이러한 팁은 이 브로셔에 열거된 부작용들에 도움이 된다는 것이 입증되지 않았습니다.

중요한 안전성 정보(계속)

다음에 포함하여 새로운 징후 또는 증상이 발생하거나 징후 또는 증상이 악화되는 경우 즉시 의료 서비스 공급자(healthcare provider, HCP)에게 전화하거나 진료를 받으십시오.

폐 문제. 징후와 증상은 기침, 숨참, 흉통을 포함할 수 있습니다.

장 문제. 징후와 증상은 설사 또는 평소보다 더 잦은 배변; 검은 타르 같은 끈적한 변 또는 혈액이나 점액이 있는 변; 중증의 위장 부위(복부) 통증 또는 압통을 포함할 수 있습니다.

문서 전반에 걸쳐 중요 안전성 정보와 **투약 지침**을 포함한 전체 **처방 정보**는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

JEMPERLI + CP 투여와 관련된 잠재적 부작용(계속)

식욕 감소

식욕 감소에 대처하기 위한 권장 사항에 대해 케어팀과 상의하십시오. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 소량을 더 자주 먹도록 노력하고, 소량을 먹은 후 포만감을 느끼면 배고플 때를 이용하여 더 많이 먹도록 노력합니다
- 배가 고프다고 느낄 때만 먹지 말고 식사 시간을 계획합니다
- 기분이 좋을 때 먹을 수 있도록 간식을 가까이 둡니다
- 영양사에게 셰이크와 인스턴트 음료 믹스에 대해 물어봅니다



부작용에 대해 주의하고 부작용이 발생하는 경우 담당 의사와 상의하십시오. 이러한 증상은 더 중대하거나 생명을 위협하는 다른 문제의 징후일 수도 있습니다. 이것들이 JEMPERLI에서 발생할 수 있는 모든 부작용은 아닙니다. 이러한 팁은 이 브로셔에 열거된 부작용들에 도움이 된다는 것이 입증되지 않았습니다.

중요한 안전성 정보(계속)

다음에 포함하여 새로운 징후 또는 증상이 발생하거나 징후 또는 증상이 악화되는 경우 즉시 의료 서비스 공급자(healthcare provider, HCP)에게 전화하거나 진료를 받으십시오(계속).

호르몬 분비선 문제. 징후와 증상은 사라지지 않는 두통 또는 비정상적인 두통, 빛에 대한 눈 민감성, 눈 문제, 빠른 심박동, 발한 증가, 극심한 피로, 체중 증가 또는 감소, 평소보다 더 배고픔 또는 갈증을 느낌, 평소보다 더 잦은 배뇨, 탈모, 추운 느낌, 변비, 목소리가 더 굵어짐, 어지러움 또는 실신, 성욕 감소, 예민함 또는 건망증과 같은 기분이나 행동의 변화를 포함할 수 있습니다.

신장 문제. 징후와 증상은 소변의 양이나 색의 변화, 소변 내 혈액, 발목 부종 또는 식욕 상실을 포함할 수 있습니다.

피부 문제. 징후와 증상은 발진; 가려움; 피부 물집 또는 벗겨짐; 림프절 부종; 구강 또는 코, 인후 또는 생식기 부위의 통증성 상처 또는 궤양; 발열 또는 독감 유사 증상을 포함할 수 있습니다.

문서 전반에 걸쳐 중요 안전성 정보와 **투약 지침**을 포함한 전체 **처방 정보**는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

JEMPERLI + CP 투여와 관련된 잠재적 부작용(계속)

요로 감염(UTI)

요로 감염(urinary track infection, UTI)에 대처하기 위한 권장 사항에 대해 케어팀과 상의하십시오. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 소변이 옅은 노란색이거나 투명하도록 충분한 양의 수분을 섭취하되, 얼마나 많은 양의 수분을 섭취해도 안전한지 의료팀에 반드시 물어보십시오
- 화장실에 자주 가고, 면 속옷과 느슨한 바지를 입고, 목욕 대신 샤워를 하여 UTI를 예방합니다
- 치료팀의 권장에 따라 약물을 투여합니다
- 카페인, 함유된 음료, 알코올, 매운 음식, 담배 제품 등 방광 문제를 악화시킬 수 있는 것들을 피합니다

구토

구토에 대처하기 위한 권장 사항에 대해 케어팀과 상의하십시오. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 강렬하거나 불쾌한 냄새가 나는 음식은 피합니다
- 수분 공급을 유지하는 방법과 얼마나 많은 물을 마셔도 안전한지에 대해 케어팀과 상의하십시오
- 더 마시고 기분이 좋아질 수 있을 만큼 천천히 수분을 섭취합니다



부작용에 대해 주의하고 부작용이 발생하는 경우 담당 의사와 상의하십시오. 이러한 증상은 더 중대하거나 생명을 위협하는 다른 문제의 징후일 수도 있습니다. 이것들이 JEMPERLI에서 발생할 수 있는 모든 부작용은 아닙니다. 이러한 팁은 이 브로셔에 열거된 부작용들에 도움이 된다는 것이 입증되지 않았습니다.

중요한 안전성 정보(계속)

다음에 포함하여 새로운 징후 또는 증상이 발생하거나 징후 또는 증상이 악화되는 경우 즉시 의료 서비스 공급자(healthcare provider, HCP)에게 전화하거나 진료를 받으십시오(계속).

간 문제. 징후와 증상은 피부 또는 눈의 흰자가 노랗게 변함, 중증 오심 또는 구토, 오른쪽 위 부위(복부) 통증, 진한색 소변(차색), 또는 평소보다 쉽게 출혈이나 멍이 생김 등을 포함할 수 있습니다.

문서 전반에 걸쳐 중요 안전성 정보와 **투약 지침**을 포함한 전체 **처방 정보**는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



치료 과정에 도움이
될 만한 추가 자료를
원하시나요?

JEMPERLI.com
을 방문하십시오

실제로 JEMPERLI를 투여하는 환자는 아님

중요한 안전성 정보(계속)

문제는 다른 기관 및 조직에서도 발생할 수 있습니다. 이 문제들은 JEMPERLI로 발생할 수 있는 면역계 문제의 모든 징후와 증상은 아닙니다. 새로운 또는 악화되는 징후나 증상에 대해 즉시 HCP에게 전화하거나 진료를 받으십시오. 징후와 증상은 흉통, 불규칙한 심박동, 숨참, 발목 부종; 혼동, 졸림, 기억력 문제, 기분이나 행동의 변화, 목의 경직, 균형 문제, 팔다리의 저림 또는 마비; 복시, 흐릿한 시야, 빛에 대한 민감성, 눈의 통증, 시력 변화; 지속적인 또는 중증의 근육 통증 또는 쇠약, 근육 경련; 낮은 적혈구, 멍을 포함할 수 있습니다.

때때로 중증이 되거나 생명을 위협할 수 있는 주입 반응. 주입 반응의 징후와 증상은 오한 또는 떨림, 가려움 또는 발진, 홍조, 숨참 또는 쌉쌉거림, 어지러움, 기절할 것 같은 느낌, 발열, 등 또는 목 통증을 포함할 수 있습니다.

이식 기관 거부. 귀하의 HCP는 귀하가 받은 기관 이식의 유형에 따라 귀하가 어떤 징후와 증상을 보고해야 하는지 알려줄 것이며 귀하를 모니터링할 것입니다.

문서 전반에 걸쳐 추가 중요 안전성 정보와 [투약 지침](#)을 포함한 전체 [처방 정보](#)는 JEMPERLI.com에서 참조하시기 바랍니다.

상표는 GSK 그룹이 소유하거나 GSK 그룹이 라이선스를 받은 것입니다.

GSK

©2024 GSK or licensor.
PMUS-DSTBROC240080 December 2024
Produced in USA.

파일 이름: Korean Side Effects Guide

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg