



Su guía para entender los posibles efectos secundarios relacionados con JEMPERLI*

*Esta información no sustituye los consejos de su proveedor de atención médica.
No dude en plantear sus inquietudes y preguntas a su médico.

No es una paciente real que toma JEMPERLI.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



Tabla de contenido

JEMPERLI puede causar efectos secundarios4

Posibles efectos secundarios relacionados con JEMPERLI por sí solo.....7

Posibles efectos secundarios relacionados con JEMPERLI + carboplatino y paclitaxel (CP)11

Usos aprobados

JEMPERLI es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultas que tienen:

- un tipo de cáncer uterino llamado cáncer de endometrio (CE)
 - JEMPERLI puede utilizarse en combinación con los medicamentos quimioterapéuticos carboplatino y paclitaxel, y, posteriormente, JEMPERLI puede utilizarse solo en los siguientes casos:
 - cuando el cáncer se ha extendido fuera del útero (avanzado) ◦
 - el cáncer ha regresado.
 - JEMPERLI puede utilizarse solo:
 - cuando una prueba de laboratorio indique que el tumor es deficiente en la reparación de los errores de emparejamiento (dMMR, mismatch repair deficient) **y**
 - el cáncer ha regresado o se ha propagado (CE avanzado) **y**
 - cuando ha recibido quimioterapia con platino, y no ha funcionado o ya no funciona **y**
 - el cáncer no se puede tratar con cirugía ni radiación.

Se desconoce si JEMPERLI es seguro y eficaz en niños.

Información Importante de Seguridad

JEMPERLI es un medicamento que actúa sobre el sistema inmunitario para tratar determinados tipos de cáncer. JEMPERLI puede hacer que su sistema inmunitario ataque los órganos y tejidos normales en cualquier lugar del organismo y puede afectar la forma en que funcionan. En ocasiones, estos problemas pueden resultar graves o poner en peligro la vida y provocar la muerte. Usted puede tener más de uno de estos problemas al mismo tiempo. Estos problemas pueden presentarse en cualquier momento durante el tratamiento o incluso después de haberlo finalizado.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg



No es una paciente real que toma JEMPERLI.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Llame o consulte a su proveedor de atención médica (HCP) de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o empeoran los existentes, incluidos los siguientes:

Problemas pulmonares. Los signos y síntomas pueden incluir tos, falta de aliento o dolor en el pecho.

Problemas intestinales. Los signos y síntomas pueden incluir diarrea o más deposiciones que de costumbre; heces negras, alquitranadas, pegajosas o con sangre o mucosidad; o sensibilidad o dolor intenso en el área del estómago (abdomen).

Problemas hepáticos. Los signos y síntomas pueden incluir piel o parte blanca de los ojos amarillentas, náuseas o vómitos intensos, dolor en el lado derecho del área del estómago (abdomen), orina oscura (como el té) o sangrado o moretones que ocurren con mayor facilidad de lo habitual.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg

JEMPERLI puede causar efectos secundarios

JEMPERLI es un medicamento que actúa sobre el sistema inmunitario para tratar determinados tipos de cáncer. JEMPERLI puede hacer que su sistema inmunitario ataque los órganos y tejidos normales en cualquier lugar del organismo y puede afectar la forma en que funcionan. En ocasiones, estos problemas pueden resultar graves o poner en peligro la vida y provocar la muerte. Usted puede tener más de uno de estos problemas al mismo tiempo. Estos problemas pueden presentarse en cualquier momento durante el tratamiento o incluso después de haberlo finalizado.

Llame o consulte a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o empeoran los existentes, incluidos los siguientes:

Problemas del sistema inmunitario

- Problemas pulmonares, como tos o falta de aliento.
- Problemas intestinales, como diarrea, más deposiciones que de costumbre o sensibilidad o dolor intenso en el área del estómago (abdomen).
- Problemas hepáticos, como piel o parte blanca de los ojos amarillentas.
- Problemas con las glándulas hormonales, como dolores de cabeza que no desaparecen o inusuales, o sensibilidad a la luz.
- Problemas renales, como hinchazón en los tobillos o sangre en la orina.
- Problemas cutáneos, como sarpullido o picazón.
- Problemas en otros órganos y tejidos, con síntomas que incluyen dolor en el pecho, dolor o debilidad muscular constantes o intensos, o visión doble.

Otros problemas

- Reacciones a la infusión que a veces pueden ser graves o potencialmente mortales, con síntomas como escalofríos, temblores, mareos, falta de aliento o sibilancia.
- Rechazo de un órgano trasplantado.
- Complicaciones, incluida la enfermedad del injerto contra el huésped (EICH), en personas que han recibido un trasplante de médula ósea (células madre) en el que se utilizan células madre de un donante (allogénico).



Estos no son todos los signos y síntomas de problemas del sistema inmunitario que pueden aparecer con JEMPERLI.
Hable con su médico para obtener más información.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg

JEMPERLI puede causar efectos secundarios (continuación)

Si recibe tratamiento médico de inmediato podría evitar que los problemas indicados en la página anterior se agraven.

- Su proveedor de atención médica la examinará para detectar estos problemas durante el tratamiento con JEMPERLI.
- Si presenta algunos efectos secundarios, su proveedor de atención médica puede optar por administrarle corticosteroides o medicamentos de reemplazo hormonal.
- Es posible que su proveedor de atención médica también deba retrasar o suspender de forma definitiva el tratamiento con JEMPERLI si tiene efectos secundarios graves.

En las participantes del estudio que recibieron JEMPERLI + carboplatino y paclitaxel (CP):

- El 19% dejó de tomar JEMPERLI por completo debido a los efectos secundarios.
- El 37% interrumpió el tratamiento a causa de los efectos secundarios.

De las participantes del estudio que recibieron JEMPERLI por sí solo:

- El 10% dejó de tomar JEMPERLI por completo debido a los efectos secundarios.
- El 28% interrumpió el tratamiento a causa de los efectos secundarios.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Llame o consulte a su proveedor de atención médica (HCP) de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o empeoran los existentes, incluidos los siguientes (continuación):

Problemas con las glándulas hormonales. Los signos y síntomas pueden incluir dolor de cabeza inusual o que no desaparece, sensibilidad ocular a la luz, problemas oculares, latidos cardíacos rápidos, aumento de la sudoración, cansancio extremo, aumento o pérdida de peso, más hambre o sed de lo habitual, orinar con más frecuencia de la habitual, caída de cabello, sensación de frío, estreñimiento, voz más grave, mareo o desmayo, cambios de humor o comportamiento como disminución del deseo sexual, irritabilidad o tendencia al olvido.

Problemas renales. Los signos y síntomas pueden incluir cambios en la cantidad o el color de la orina, sangre en la orina, hinchazón de tobillos o pérdida de apetito.

Problemas cutáneos. Los signos y síntomas pueden incluir erupción, picazón, formación de ampollas o descamación de la piel, inflamación de los ganglios linfáticos, llagas o úlceras dolorosas en la boca, la nariz, la garganta o la zona genital; fiebre o síntomas de tipo gripal.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg



JEMPERLI puede causar efectos secundarios (continuación)

Los efectos secundarios más frecuentes de JEMPERLI cuando se administra con carboplatino y paclitaxel incluyen problemas nerviosos en los brazos, las manos, las piernas y los pies; cansancio; náuseas; caída del cabello; dolor articular; sarpullido; estreñimiento; diarrea; dolor en el área del vientre (abdomen); falta de aliento; disminución del apetito; infecciones de las vías urinarias; vómitos.

Los efectos secundarios más frecuentes de JEMPERLI cuando se administra por sí solo son cansancio y debilidad, recuento bajo de glóbulos rojos (anemia), diarrea, náuseas, estreñimiento y vómitos.



Esté atenta y hable con su médico sobre todos los efectos secundarios que experimente. Podrían ser un indicio de problemas más graves o potencialmente mortales. Si desea obtener más información sobre los efectos secundarios, visite [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com).

Información Importante de Seguridad (continuación)

También pueden producirse problemas en otros órganos y tejidos. Estos no son todos los signos y síntomas de problemas del sistema inmunitario que pueden aparecer con JEMPERLI. Llame o consulte a su HCP de inmediato si aparece algún signo o síntoma nuevo o que empeore. Los signos y síntomas pueden incluir dolor en el pecho, latidos cardíacos irregulares, falta de aliento, hinchazón de tobillos, confusión, tendencia al sueño, problemas de memoria, cambios de humor o comportamiento, cuello rígido, problemas de equilibrio, sensación de hormigueo o entumecimiento de brazos o piernas, visión doble, visión borrosa, sensibilidad a la luz, dolor de los ojos, cambios en la visión, dolor o debilidad muscular constantes o intensos, calambres musculares, recuento bajo de glóbulos rojos, moretones.

Reacciones a la infusión que, a veces, pueden ser graves o potencialmente mortales. Los signos y síntomas de reacciones a la infusión pueden incluir escalofríos o temblores, picazón o erupción, rubefacción, falta de aliento o sibilancia, mareo, sensación de desmayo, fiebre, dolor de espalda o cuello.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com).

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg

Posibles efectos secundarios relacionados con JEMPERLI por sí solo



Cada persona vive el tratamiento de manera distinta. Es importante que consulte a su médico si comienza a presentar efectos secundarios, o si estos se agravan. A continuación, se presenta información sobre algunas recomendaciones que su equipo de atención médica podría ofrecerle para manejar determinados efectos secundarios de JEMPERLI, aunque no los incluye todos. **Informe siempre a su proveedor de atención médica cualquier efecto secundario que presente y siga sus indicaciones.**



Esté atenta y hable con su médico sobre todos los efectos secundarios que experimente. Podrían ser un indicio de problemas más graves o potencialmente mortales. Los efectos secundarios mencionados en este folleto no abarcan todos los que puede experimentar con JEMPERLI. Además, no se ha demostrado la eficacia de los consejos aquí proporcionados en el alivio de estos efectos secundarios.

Cansancio y debilidad

Pida a su equipo de atención recomendaciones para manejar el cansancio y la debilidad, las que pueden incluir:

- Organizar el día para priorizar las actividades más importantes y distribuirlas a lo largo de la jornada.
- Tomar descansos o siestas breves en lugar de una larga.
- Diseñar un programa de ejercicios adaptado a sus necesidades.
- Intentar dormir de 7 a 8 horas cada noche.
- Evitar factores que interrumpan el sueño, como la cafeína y el ejercicio antes de acostarse.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Rechazo de un órgano trasplantado. Su HCP debe indicarle qué signos y síntomas debe notificar, y deberá vigilarla, según el tipo de trasplante de órgano que haya recibido.

Complicaciones, incluida la enfermedad del injerto contra el huésped (EICH), en personas que han recibido un trasplante de médula ósea (células madre) en el que se utilizan células madre de un donante (allogénico). Estas complicaciones pueden ser graves y causar la muerte. Estas complicaciones se pueden producir si se sometió a un trasplante antes o después de recibir tratamiento con JEMPERLI. Su HCP la vigilará para detectar estas complicaciones.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Posibles efectos secundarios relacionados con JEMPERLI por sí solo (continuación)



Confíe en su equipo de atención. Ellos comprenden cómo se siente y disponen de recursos que pueden serle útiles.

Diarrea

Pida a su equipo de atención recomendaciones para controlar la diarrea, las que pueden incluir:

- Evitar los alimentos fritos y aquellos ricos en fibra, como legumbres y cereales integrales.
- Reducir el consumo de alcohol o tabaco.
- Tomar un medicamento para la diarrea, ya sea de venta libre o con receta, siempre de acuerdo con las indicaciones.



Esté atenta y hable con su médico sobre todos los efectos secundarios que experimente. Podrían ser un indicio de problemas más graves o potencialmente mortales. Estos no son todos los posibles efectos secundarios que puede experimentar con JEMPERLI. No se ha demostrado la eficacia de estos consejos en relación con los efectos secundarios indicados en este folleto.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Si recibe tratamiento médico de inmediato podría evitar que estos problemas se agraven. Su HCP la examinará para detectar estos problemas durante el tratamiento con JEMPERLI y podrá administrarle corticosteroides o medicamentos de reemplazo hormonal. Si tiene efectos secundarios graves, es posible que su HCP también deba retrasar o suspender de forma definitiva el tratamiento con JEMPERLI.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg



No es una paciente real que toma JEMPERLI.

Posibles efectos secundarios relacionados con JEMPERLI por sí solo (continuación)

Náuseas

Pida a su equipo de atención recomendaciones para controlar las náuseas, las que pueden incluir:

- Intentar no saltarse comidas ni bocadillos, ya que un estómago vacío puede agravar las náuseas.
- Tener a mano tostadas secas, galletas saladas y otros alimentos livianos.
- Evitar alimentos grasos, fritos, picantes o muy dulces.
- Beber líquidos a sorbos lentamente a lo largo del día.
- Tomar un medicamento para las náuseas, ya sea de venta libre o con receta, siempre de acuerdo con las indicaciones.
- Probar la aromaterapia con esencias como la de menta.



Esté atenta y hable con su médico sobre todos los efectos secundarios que experimente. Podrían ser un indicio de problemas más graves o potencialmente mortales. Estos no son todos los posibles efectos secundarios que puede experimentar con JEMPERLI. No se ha demostrado la eficacia de estos consejos en relación con los efectos secundarios indicados en este folleto.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Antes de recibir JEMPERLI, informe a su HCP sobre todas sus afecciones médicas, como, por ejemplo problemas del sistema inmunitario, como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o lupus; ha recibido un trasplante de órgano; ha recibido o tiene previsto recibir un trasplante de células madre en el que se utilicen células madre de un donante (allogénico); ha recibido radioterapia en la zona torácica; padece alguna enfermedad que afecte al sistema nervioso, como miastenia grave o síndrome de Guillain-Barré.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg

Posibles efectos secundarios relacionados con JEMPERLI por sí solo (continuación)

Estreñimiento

Pida a su equipo de atención recomendaciones para controlar el estreñimiento, las que pueden incluir:

- Intentar aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra, como frutas y verduras frescas, avena, pan integral y arroz integral.
- Mantener una buena hidratación, pero consulte a su equipo de atención sobre la cantidad que puede beber sin riesgo.
- Mantenerse activa con un plan de ejercicios adecuado a sus necesidades.
- Tomar un medicamento para el estreñimiento, ya sea de venta libre o con receta, siempre de acuerdo con las indicaciones.

Vómitos

Pida a su equipo de atención recomendaciones para controlar los vómitos, las que pueden incluir:

- Evitar alimentos con olores fuertes o desagradables.
- Beber líquidos a sorbos lentamente hasta que se sienta lo suficientemente bien como para beber más.
- Consultar a su equipo médico cómo mantenerse hidratada y la cantidad de líquidos que puede consumir sin riesgo.



Esté atenta y hable con su médico sobre todos los efectos secundarios que experimente. Podrían ser un indicio de problemas más graves o potencialmente mortales. Estos no son todos los posibles efectos secundarios que puede experimentar con JEMPERLI. No se ha demostrado la eficacia de estos consejos en relación con los efectos secundarios indicados en este folleto.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Si está embarazada o planea quedar embarazada, infórmelo a su HCP. JEMPERLI puede dañar al feto. Si puede quedar embarazada, su HCP le realizará una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento. Utilice un método anticonceptivo eficaz durante su tratamiento y durante los 4 meses siguientes a la última dosis de JEMPERLI. Si queda embarazada durante su tratamiento con JEMPERLI o si cree que podría estar embarazada, infórmelo de inmediato a su HCP.

Si está amamantando o planea amamantar, infórmelo a su HCP. Se desconoce si JEMPERLI pasa a través de la leche materna. No amamante durante el tratamiento con JEMPERLI y durante 4 meses después de su última dosis.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg

Posibles efectos secundarios relacionados con JEMPERLI + CP



Cada persona vive el tratamiento de manera distinta. Por ello es importante que consulte a su médico si comienza a presentar efectos secundarios o si estos se agravan. A continuación, se presenta información sobre algunas recomendaciones que su equipo de atención médica podría ofrecerle para manejar determinados efectos secundarios de JEMPERLI, aunque no los incluye todos. **Informe siempre a su proveedor de atención médica cualquier efecto secundario que presente y siga sus indicaciones.**

Problemas nerviosos en los brazos, las manos, las piernas y los pies

Pida a su equipo de atención recomendaciones para controlar los problemas nerviosos, las que pueden incluir:

- Revisar periódicamente las manos y los pies en busca de lesiones, cortes o llagas.
- Limitar o evitar el consumo de alcohol.
- Realizar ejercicios suaves de estiramiento y equilibrio.
- Proteger las manos y los pies de temperaturas extremas, como usar zapatos y ropa abrigada cuando hace frío, y proteger las manos del calor mientras cocina.
- Prevenir caídas mediante el retiro de alfombras del camino y la instalación de barandillas en las paredes y en el baño.
- Levantarse lentamente después de estar sentada o acostada, especialmente si se siente mareada.
- Tomar un medicamento para el dolor, ya sea en forma de parche o crema de venta libre o con receta, siempre de acuerdo con las indicaciones.



Esté atenta y hable con su médico sobre todos los efectos secundarios que experimente. Podrían ser un indicio de problemas más graves o potencialmente mortales. Los efectos secundarios mencionados en este folleto no abarcan todos los que puede experimentar con JEMPERLI. Además, no se ha demostrado la eficacia de los consejos aquí proporcionados en el alivio de estos efectos secundarios.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Infórmele a su HCP sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg

Posibles efectos secundarios relacionados con JEMPERLI + CP (continuación)

Cansancio

Pida a su equipo de atención recomendaciones para hacer frente al cansancio, las que pueden incluir:

- Organizar el día para priorizar las actividades más importantes y distribuirlas a lo largo de la jornada.
- Tomar descansos o siestas breves en lugar de una larga.
- Diseñar un programa de ejercicios adaptado a sus necesidades.
- Intentar dormir de 7 a 8 horas cada noche.
- Evitar factores que interrumpan el sueño, como la cafeína y el ejercicio antes de acostarse.

Náuseas

Pida a su equipo de atención recomendaciones para controlar las náuseas, las que pueden incluir:

- Intentar no saltarse comidas ni bocadillos, ya que un estómago vacío puede agravar las náuseas.
- Tener a mano tostadas secas, galletas saladas y otros alimentos livianos.
- Evitar alimentos grasos, fritos, picantes o muy dulces.
- Beber líquidos a sorbos lentamente a lo largo del día.
- Tomar un medicamento para las náuseas, ya sea de venta libre o con receta, siempre de acuerdo con las indicaciones.
- Probar la aromaterapia con esencias como la de menta.



Esté atenta y hable con su médico sobre todos los efectos secundarios que experimente. Podrían ser un indicio de problemas más graves o potencialmente mortales. Estos no son todos los posibles efectos secundarios que puede experimentar con JEMPERLI. No se ha demostrado la eficacia de estos consejos en relación con los efectos secundarios indicados en este folleto.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Los efectos secundarios más frecuentes de JEMPERLI cuando se administra con carboplatino y paclitaxel incluyen problemas nerviosos en los brazos, las manos, las piernas y los pies; cansancio; náuseas; caída del cabello; dolor articular; erupción; estreñimiento; diarrea; dolor en el área del estómago (abdomen); falta de aliento; apetito disminuido; infecciones de las vías urinarias; vómitos.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg

Posibles efectos secundarios relacionados con JEMPERLI + CP (continuación)

Caída de cabello

Pida a su equipo de atención recomendaciones para controlar la caída de cabello, las que pueden incluir:

- Evaluar la probabilidad de caída de cabello y el momento en que podría comenzar.
- Reconocer que es natural sentirse incómoda por la caída del cabello; algunas personas optan por cortarse el pelo o afeitarse la cabeza antes de que empiece a caerse.
- Probar diferentes opciones como pelucas, pañuelos y sombreros para ver cuál le resulta más cómoda.

Dolor articular

Pida a su equipo de atención recomendaciones para controlar el dolor articular, las que pueden incluir:

- Aplicar una compresa fría, una bolsa de hielo o un paquete de verduras congeladas en la zona afectada durante 15 a 20 minutos varias veces al día.
- Usar una almohadilla térmica, sumergirse en una bañera tibia o tomar una ducha tibia para relajar los músculos y mejorar la circulación sanguínea.
- Consultar a un fisioterapeuta que le enseñe ejercicios suaves de estiramiento para aliviar la tensión muscular.
- Tomar un medicamento para el dolor, ya sea de venta libre o con receta, siempre de acuerdo con las indicaciones.



Esté atenta y hable con su médico sobre todos los efectos secundarios que experimente. Podrían ser un indicio de problemas más graves o potencialmente mortales. Estos no son todos los posibles efectos secundarios que puede experimentar con JEMPERLI. No se ha demostrado la eficacia de estos consejos en relación con los efectos secundarios indicados en este folleto.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Los efectos secundarios más frecuentes de JEMPERLI cuando se usa solo son cansancio y debilidad, recuento bajo de glóbulos rojos (anemia), diarrea, náuseas, estreñimiento y vómitos.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de JEMPERLI. Comuníquese con su médico para que le dé consejos con respecto a los efectos secundarios.

Se recomienda notificar a la FDA de los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, Food and Drug Administration). Para ello, llame al 1-800-FDA-1088 o visite www.fda.gov/medwatch.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg



Posibles efectos secundarios relacionados con JEMPERLI + CP (continuación)

Erupción

Pida a su equipo de atención recomendaciones para controlar el sarpullido, las que pueden incluir:

- Utilizar lociones y cremas hidratantes suaves.
- Limpiar la zona con un jabón y un paño suaves.
- Proteger la zona del calor y del frío.
- Evitar la exposición al sol en la medida de lo posible.
- Tomar un medicamento para el sarpullido, ya sea de venta libre o con receta, siempre de acuerdo con las indicaciones.



Esté atenta y hable con su médico sobre todos los efectos secundarios que experimente. Podrían ser un indicio de problemas más graves o potencialmente mortales. Estos no son todos los posibles efectos secundarios que puede experimentar con JEMPERLI. No se ha demostrado la eficacia de estos consejos en relación con los efectos secundarios indicados en este folleto.

Información Importante de Seguridad (continuación)

JEMPERLI es un medicamento que actúa sobre el sistema inmunitario para tratar determinados tipos de cáncer. JEMPERLI puede hacer que su sistema inmunitario ataque los órganos y tejidos normales en cualquier lugar del organismo y puede afectar la forma en que funcionan. En ocasiones, estos problemas pueden resultar graves o poner en peligro la vida y provocar la muerte. Usted puede tener más de uno de estos problemas al mismo tiempo. Estos problemas pueden presentarse en cualquier momento durante el tratamiento o incluso después de haberlo finalizado.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg

Posibles efectos secundarios relacionados con JEMPERLI + CP (continuación)

Estreñimiento

Pida a su equipo de atención recomendaciones para controlar el estreñimiento, las que pueden incluir:

- Intentar aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra, como frutas y verduras frescas, avena, pan integral y arroz integral.
- Mantener una buena hidratación, pero consulte a su equipo de atención sobre la cantidad que puede beber sin riesgo.
- Mantenerse activa con un plan de ejercicios adecuado a sus necesidades.
- Tomar un medicamento para el estreñimiento, ya sea de venta libre o con receta, siempre de acuerdo con las indicaciones.

Diarrea

Pida a su equipo de atención recomendaciones para controlar la diarrea, las que pueden incluir:

- Evitar los alimentos fritos y aquellos ricos en fibra, como legumbres y cereales integrales.
- Reducir el consumo de alcohol o tabaco.
- Tomar un medicamento para la diarrea, ya sea de venta libre o con receta, siempre de acuerdo con las indicaciones.



Esté atenta y hable con su médico sobre todos los efectos secundarios que experimente. Podrían ser un indicio de problemas más graves o potencialmente mortales. Estos no son todos los posibles efectos secundarios que puede experimentar con JEMPERLI. No se ha demostrado la eficacia de estos consejos en relación con los efectos secundarios indicados en este folleto.

Información Importante de Seguridad

Llame o consulte a su proveedor de atención médica (HCP) de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o empeoran los existentes, incluidos los siguientes (continuación):

Problemas pulmonares. Los signos y síntomas pueden incluir tos, falta de aliento o dolor en el pecho.

Problemas intestinales. Los signos y síntomas pueden incluir diarrea o más deposiciones que de costumbre; heces negras, alquitranadas, pegajosas o con sangre o mucosidad; o sensibilidad o dolor intenso en el área del estómago (abdomen).

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg

Posibles efectos secundarios relacionados con JEMPERLI + CP (continuación)

Disminución del apetito

Pida a su equipo de atención recomendaciones para tratar la disminución del apetito, las que pueden incluir:

- Intentar comer porciones pequeñas con mayor frecuencia y aprovechar los momentos en que sienta hambre para comer un poco más si se siente saciada después de una pequeña cantidad.
- Programar las comidas en lugar de esperar a tener hambre para comer.
- Mantener bocadillos a la mano para poder comer cuando lo desee.
- Consultar a un dietista sobre batidos y mezclas de bebidas instantáneas.



Esté atenta y hable con su médico sobre todos los efectos secundarios que experimente. Podrían ser un indicio de problemas más graves o potencialmente mortales. Estos no son todos los posibles efectos secundarios que puede experimentar con JEMPERLI. No se ha demostrado la eficacia de estos consejos en relación con los efectos secundarios indicados en este folleto.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Llame o consulte a su proveedor de atención médica (HCP) de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o empeoran los existentes, incluidos los siguientes (continuación):

Problemas hepáticos. Los signos y síntomas pueden incluir piel o parte blanca de los ojos amarillentas, náuseas o vómitos intensos, dolor en el lado derecho del área del estómago (abdomen), orina oscura (como el té) o sangrado o moretones que ocurren con mayor facilidad de lo habitual.

Problemas con las glándulas hormonales. Los signos y síntomas pueden incluir dolor de cabeza inusual o que no desaparece, sensibilidad ocular a la luz, problemas oculares, latidos cardíacos rápidos, aumento de la sudoración, cansancio extremo, aumento o pérdida de peso, más hambre o sed de lo habitual, orinar con más frecuencia de la habitual, caída de cabello, sensación de frío, estreñimiento, voz más grave, mareo o desmayo, cambios de humor o comportamiento como disminución del deseo sexual, irritabilidad o tendencia al olvido.

Problemas renales. Los signos y síntomas pueden incluir cambios en la cantidad o el color de la orina, sangre en la orina, hinchazón de tobillos o pérdida de apetito.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg

Posibles efectos secundarios relacionados con JEMPERLI + CP (continuación)

Infección de las vías urinarias (IVU)

Pida a su equipo de atención recomendaciones para controlar las IVU, las que pueden incluir:

- Beber abundante líquido para que la orina sea de color amarillo claro o transparente; sin embargo, consulte a su equipo de atención qué cantidad puede consumir sin riesgo.
- Evitar factores que puedan agravar los problemas de vejiga, como las bebidas con cafeína, el alcohol, los alimentos picantes y el tabaco.
- Prevenir las infecciones urinarias mediante visitas frecuentes al baño, el uso de ropa interior de algodón y pantalones holgados, y optar por ducharse en lugar de bañarse.
- Tomar el medicamento recomendado por su equipo de atención.

Vómitos

Pida a su equipo de atención recomendaciones para controlar los vómitos, las que pueden incluir:

- Evitar alimentos con olores fuertes o desagradables.
- Beber líquidos a sorbos lentamente hasta que se sienta lo suficientemente bien como para beber más.
- Consultar a su equipo médico cómo mantenerse hidratada y la cantidad de líquidos que puede consumir sin riesgo.



Esté atenta y hable con su médico sobre todos los efectos secundarios que experimente. Podrían ser un indicio de problemas más graves o potencialmente mortales. Estos no son todos los posibles efectos secundarios que puede experimentar con JEMPERLI. No se ha demostrado la eficacia de estos consejos en relación con los efectos secundarios indicados en este folleto.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Llame o consulte a su proveedor de atención médica (HCP) de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o empeoran los existentes, incluidos los siguientes (continuación):

Problemas cutáneos. Los signos y síntomas pueden incluir erupción, picazón, formación de ampollas o descamación de la piel, inflamación de los ganglios linfáticos, llagas o úlceras dolorosas en la boca, la nariz, la garganta o la zona genital; fiebre o síntomas de tipo gripal.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg



No es una paciente real que toma JEMPERLI.

Información Importante de Seguridad (continuación)

También pueden producirse problemas en otros órganos y tejidos. Estos no son todos los signos y síntomas de problemas del sistema inmunitario que pueden aparecer con JEMPERLI. Llame o consulte a su HCP de inmediato si aparece algún signo o síntoma nuevo o que empeore. Los signos y síntomas pueden incluir dolor en el pecho, latidos cardíacos irregulares, falta de aliento, hinchazón de tobillos, confusión, tendencia al sueño, problemas de memoria, cambios de humor o comportamiento, cuello rígido, problemas de equilibrio, sensación de hormigueo o entumecimiento de brazos o piernas, visión doble, visión borrosa, sensibilidad a la luz, dolor de los ojos, cambios en la visión, dolor o debilidad muscular constantes o intensos, calambres musculares, recuento bajo de glóbulos rojos, moretones.

Reacciones a la infusión que, a veces, pueden ser graves o potencialmente mortales. Los signos y síntomas de reacciones a la infusión pueden incluir escalofríos o temblores, picazón o erupción, rubefacción, falta de aliento o sibilancia, mareo, sensación de desmayo, fiebre, dolor de espalda o cuello.

Rechazo de un órgano trasplantado. Su HCP debe indicarle qué signos y síntomas debe notificar, y deberá vigilarla, según el tipo de trasplante de órgano que haya recibido.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com).

Las marcas comerciales son propiedad del grupo de empresas de GSK o se le han otorgado bajo licencia.

GSK

©2024 GSK or licensor.
PMUS-DSTBROC240077 December 2024
Produced in USA.

Nombre del archivo: Spanish Side Effects Guide

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg