



Hướng dẫn về tác dụng phụ

Hướng dẫn để giúp quý vị hiểu được các tác dụng phụ có thể xảy ra liên quan đến JEMPERLI*

*Thông tin này không thay thế cho lời khuyên từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị. Hãy bày tỏ những mối lo ngại và thắc mắc của quý vị với bác sĩ.

Đây không phải là bệnh nhân thật đang dùng JEMPERLI.

Vui lòng xem Thông tin An toàn quan trọng xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



Mục lục

Quý vị có thể gặp phải tác dụng phụ khi dùng JEMPERLI4

Các tác dụng phụ có thể xảy ra liên quan đến JEMPERLI khi được dùng riêng7

Các tác dụng phụ có thể xảy ra liên quan đến JEMPERLI + carboplatin và paclitaxel (CP)11

Trường hợp sử dụng được phê duyệt

JEMPERLI là thuốc kê đơn dùng để điều trị cho người lớn mắc:

- một loại ung thư tử cung được gọi là ung thư nội mạc tử cung (EC)
 - JEMPERLI có thể được dùng kết hợp với thuốc hóa trị carboplatin và paclitaxel, sau đó, JEMPERLI có thể được dùng riêng:
 - khi bệnh ung thư của quý vị đã di căn ra ngoài tử cung (tiến triển) **hoặc**,
 - bệnh ung thư của quý vị tái phát.
 - JEMPERLI có thể được dùng riêng:
 - khi xét nghiệm cho thấy khối u của quý vị bị thiếu hụt sửa chữa bắt cặp sai (dMMR), **và**
 - bệnh ung thư của quý vị tái phát hoặc đã di căn (EC tiến triển), **và**
 - quý vị đã được hóa trị bằng thuốc có chứa platinum và phương pháp điều trị đó không có tác dụng hoặc không còn tác dụng nữa, **và**
 - không thể điều trị bệnh ung thư của quý vị bằng phẫu thuật hoặc xạ trị.

Chưa rõ JEMPERLI có an toàn và hiệu quả ở trẻ em không.

Thông tin An toàn quan trọng

JEMPERLI là loại thuốc có thể điều trị một số bệnh ung thư bằng cách tác động lên hệ miễn dịch của quý vị. JEMPERLI có thể khiến hệ miễn dịch của quý vị tấn công các cơ quan và mô bình thường tại bất kỳ phần nào trong cơ thể và có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan/mô đó. Những vấn đề này đôi khi có thể trở nên nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng và có thể dẫn đến tử vong. Quý vị có thể gặp nhiều vấn đề cùng một lúc. Những vấn đề này có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong quá trình điều trị hoặc thậm chí sau khi quá trình điều trị kết thúc.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



Đây không phải là bệnh nhân thật đang dùng JEMPERLI.

Thông tin An toàn quan trọng (tiếp)

Hãy gọi điện hoặc gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (HCP) ngay nếu quý vị có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào mới hoặc xấu đi, bao gồm:

Các vấn đề về phổi. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm ho, khó thở hoặc đau ngực.

Các vấn đề về tiêu hóa. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm tiêu chảy hoặc đi ngoài nhiều hơn bình thường; phân có màu đen, hắc ín, dính hoặc có máu hay chất nhầy; hoặc quý vị thấy đau dữ dội ở bên trong dạ dày (bụng) hoặc đau dữ dội khi ấn vào vùng bụng.

Các vấn đề về gan. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm vàng da hoặc lòng trắng mắt chuyển màu vàng, buồn nôn hoặc nôn dữ dội, đau ở bên phải vùng dạ dày (bụng), nước tiểu sẫm màu (màu trà), dễ chảy máu hoặc bầm tím hơn bình thường.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Quý vị có thể gặp phải tác dụng phụ khi dùng JEMPERLI

JEMPERLI là loại thuốc có thể điều trị một số bệnh ung thư bằng cách tác động lên hệ miễn dịch của quý vị. JEMPERLI có thể khiến hệ miễn dịch của quý vị tấn công các cơ quan và mô bình thường tại bất kỳ phần nào trong cơ thể và có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan/mô đó. Những vấn đề này đôi khi có thể trở nên nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng và có thể dẫn đến tử vong. Quý vị có thể gặp nhiều vấn đề cùng một lúc. Những vấn đề này có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong quá trình điều trị hoặc thậm chí sau khi quá trình điều trị kết thúc.

Hãy gọi điện cho hoặc thăm khám với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay nếu quý vị có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào mới hoặc xấu đi, bao gồm:

Các vấn đề về hệ miễn dịch

- Các vấn đề về phổi, như ho hoặc khó thở
- Các vấn đề về tiêu hóa, như tiêu chảy hoặc đi ngoài nhiều hơn bình thường, đau nghiêm trọng ở vùng bụng hoặc đau nghiêm trọng khi ấn vào vùng bụng
- Các vấn đề về gan, như vàng da hoặc lòng trắng mắt chuyển màu vàng
- Các vấn đề về tuyến nội tiết, như đau đầu không dứt hoặc đau đầu bất thường hoặc mắt nhạy cảm với ánh sáng
- Các vấn đề về thận, như sưng ở mắt cá chân hoặc nước tiểu có máu
- Các vấn đề về da, như phát ban hoặc ngứa
- Các vấn đề ở các cơ quan và mô khác, với các triệu chứng bao gồm đau ngực, đau cơ hay yếu cơ dai dẳng hoặc nghiêm trọng hoặc song thị

Các vấn đề khác

- Các phản ứng tiêm truyền đôi khi có thể trở nên nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng, với các triệu chứng bao gồm ớn lạnh hoặc run rẩy, chóng mặt, khó thở hoặc thở khó khè
- Thải tạng ghép
- Các biến chứng, bao gồm bệnh mảnh ghép chống ký chủ (GVHD), ở những người được ghép tủy xương (tế bào gốc) sử dụng tế bào gốc của người hiến tặng (đồng loài)



Đây không phải là tất cả các dấu hiệu và triệu chứng của các vấn đề về hệ miễn dịch có thể xảy ra khi dùng JEMPERLI. **Hãy trao đổi với bác sĩ của quý vị để tìm hiểu thêm.**

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Quý vị có thể gặp phải tác dụng phụ khi dùng JEMPERLI (tiếp)

Việc điều trị y tế ngay lập tức có thể giúp ngăn những vấn đề đã nêu ở trang trước trở nên nghiêm trọng hơn.

- Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ kiểm tra những vấn đề này cho quý vị trong quá trình điều trị bằng JEMPERLI
- Nếu quý vị gặp một số tác dụng phụ nhất định, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể dùng corticosteroid hoặc thuốc thay thế hormone để điều trị cho quý vị
- Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng có thể cần phải trì hoãn hoặc ngừng hẳn việc điều trị bằng JEMPERLI nếu quý vị gặp tác dụng phụ nghiêm trọng

Trong số những người tham gia nghiên cứu được cho dùng JEMPERLI + carboplatin và paclitaxel (CP):

- 19% người ngừng dùng JEMPERLI hoàn toàn do tác dụng phụ
- 37% người bị tác dụng phụ gây gián đoạn quá trình điều trị

Trong số những người tham gia nghiên cứu chỉ được cho dùng JEMPERLI:

- 10% người ngừng dùng JEMPERLI hoàn toàn do tác dụng phụ
- 28% người bị tác dụng phụ gây gián đoạn quá trình điều trị

Thông tin An toàn quan trọng (tiếp)

Hãy gọi điện hoặc gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (HCP) ngay nếu quý vị có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào mới hoặc xấu đi, bao gồm (tiếp):

Các vấn đề về tuyến nội tiết. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm đau đầu không khỏi hoặc đau đầu bất thường, mắt nhạy cảm với ánh sáng, các vấn đề về mắt, nhịp tim nhanh, đổ mồ hôi nhiều, mệt mỏi cực độ, tăng cân hoặc giảm cân, cảm thấy đói hoặc khát nhiều hơn bình thường, đi tiểu thường xuyên hơn bình thường, rụng tóc, cảm thấy ớn lạnh, táo bón, giọng nói trầm hơn, chóng mặt hoặc ngất xỉu, thay đổi tâm trạng hoặc hành vi như giảm ham muốn tình dục, cấu kỉnh hoặc hay quên.

Các vấn đề về thận. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm thay đổi về lượng hoặc màu sắc nước tiểu, nước tiểu có máu, sưng mắt cá chân hoặc chán ăn.

Các vấn đề về da. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm phát ban; ngứa; da phồng rộp hoặc bong tróc; sưng hạch bạch huyết; xuất hiện vết loét hoặc vết đau ở miệng hoặc mũi, họng hoặc bộ phận sinh dục; sốt hoặc các triệu chứng giống như cúm.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Quý vị có thể gặp phải tác dụng phụ khi dùng JEMPERLI (tiếp)

Các tác dụng phụ thường gặp nhất khi sử dụng kết hợp JEMPERLI + CP bao gồm các vấn đề dây thần kinh ở cánh tay, bàn tay, bàn chân và toàn bộ chân; mệt mỏi; buồn nôn; rụng tóc; đau khớp; phát ban; táo bón; tiêu chảy; đau vùng bụng; khó thở; chán ăn; nhiễm trùng đường tiết niệu; nôn mửa.

Các tác dụng phụ thường gặp nhất của JEMPERLI khi được dùng riêng bao gồm mệt mỏi và suy nhược; giảm số lượng hồng cầu (thiếu máu); tiêu chảy; buồn nôn; táo bón; nôn mửa.



Hãy để ý mọi tác dụng phụ mà quý vị gặp phải

và trao đổi với bác sĩ về các tác dụng phụ đó. Đó có thể là dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng hơn hoặc đe dọa đến tính mạng.

Để tìm hiểu thêm về các tác dụng phụ, hãy truy cập vào trang JEMPERLI.com.

Thông tin An toàn quan trọng (tiếp)

Các vấn đề cũng có thể xảy ra tại các cơ quan và mô khác. Đây không phải là tất cả các dấu hiệu và triệu chứng của các vấn đề về hệ thống miễn dịch có thể xảy ra với JEMPERLI. Hãy gọi điện hoặc gặp HCP ngay nếu có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng mới hoặc trở nặng nào. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm đau ngực, nhịp tim không đều, khó thở, sưng mắt cá chân; lú lẫn, buồn ngủ, vấn đề về trí nhớ, thay đổi tâm trạng hoặc hành vi, cứng cổ, vấn đề mất thăng bằng, ngứa ran hoặc tê bì ở tay hoặc chân; song thị, mờ mắt, nhạy cảm với ánh sáng, đau mắt, thay đổi thị lực; đau cơ dai dẳng hoặc nghiêm trọng hay yếu cơ, chuột rút cơ; giảm số lượng hồng cầu, bầm tím.

Những phản ứng tiêm truyền mà đôi khi có thể trở nên nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng.

Các dấu hiệu và triệu chứng của phản ứng tiêm truyền có thể bao gồm ớn lạnh hoặc run rẩy, ngứa hoặc phát ban, đỏ mặt, khó thở hoặc thở khò khè, chóng mặt, có cảm giác sắp ngất xỉu, sốt, đau lưng hoặc đau cổ.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Các tác dụng phụ có thể xảy ra liên quan đến JEMPERLI khi được dùng riêng



Mỗi người đều có trải nghiệm điều trị khác nhau. Điều quan trọng là quý vị cần trao đổi với bác sĩ khi bắt đầu gặp phải tác dụng phụ hoặc nếu tác dụng phụ xấu đi theo bất cứ hình thức nào. Vui lòng xem phần bên dưới để biết thêm thông tin về các mẹo hay mà đội ngũ chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể đề xuất để khắc phục một số tác dụng phụ nhất định, mặc dù đây không phải là tất cả các tác dụng phụ có thể xảy ra khi dùng JEMPERLI. **Hãy luôn thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về tất cả các tác dụng phụ quý vị có thể gặp phải và làm theo hướng dẫn của họ.**



Hãy để ý mọi tác dụng phụ mà quý vị gặp phải **và trao đổi với bác sĩ về các tác dụng phụ đó**. Đó có thể là dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng hơn hoặc đe dọa đến tính mạng. Các tác dụng phụ trong tờ thông tin này không phải là tất cả các tác dụng phụ mà quý vị có thể gặp phải khi sử dụng JEMPERLI. Các mẹo hay được nêu trong tờ hướng dẫn này chưa được chứng minh là có thể hỗ trợ khắc phục những tác dụng phụ này.

Mệt mỏi và suy nhược

Hãy trao đổi với đội ngũ chăm sóc của quý vị về các khuyến nghị của họ để khắc phục tình trạng mệt mỏi và suy nhược. Các khuyến nghị này có thể bao gồm:

- Lập kế hoạch hoạt động trong ngày của quý vị để ưu tiên những việc quan trọng nhất và phân bổ các hoạt động trong suốt cả ngày
- Nghỉ ngơi hoặc ngủ trưa ngắn thay vì ngủ trưa lâu
- Lên kế hoạch tập thể dục phù hợp cho bản thân
- Đặt mục tiêu ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm
- Tránh những thứ làm gián đoạn giấc ngủ, ví dụ như caffeine và tập thể dục buổi tối

Thông tin An toàn quan trọng (tiếp)

Thải tạng ghép. HCP sẽ cho biết quý vị nên báo cáo những dấu hiệu và triệu chứng nào và theo dõi tình trạng của quý vị, tùy thuộc vào loại tạng quý vị được ghép.

Các biến chứng, bao gồm bệnh mảnh ghép chống ký chủ (GVHD), ở những người được ghép tủy xương (tế bào gốc) sử dụng tế bào gốc của người hiến tặng (đồng loài). Những biến chứng này có thể rất nghiêm trọng và có thể dẫn tới tử vong. Những biến chứng này có thể xảy ra nếu quý vị được ghép trước hoặc sau khi điều trị bằng JEMPERLI. HCP sẽ theo dõi tình trạng của quý vị để phát hiện những biến chứng này.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Các tác dụng phụ có thể xảy ra liên quan đến JEMPERLI khi được dùng riêng (tiếp)



Hãy tin tưởng đội ngũ chăm sóc của quý vị. Họ hiểu được cảm giác của quý vị và có những nguồn tài nguyên có thể hỗ trợ quý vị.

Tiêu chảy

Hãy trao đổi với đội ngũ chăm sóc của quý vị về các khuyến nghị của họ để khắc phục tình trạng tiêu chảy. Các khuyến nghị này có thể bao gồm:

- Tránh đồ ăn chiên rán và đồ ăn giàu chất xơ như đậu và ngũ cốc nguyên cám
- Giảm thiểu việc sử dụng đồ uống có cồn hoặc thuốc lá
- Dùng thuốc điều trị tiêu chảy, đó có thể là thuốc kê đơn hoặc thuốc không kê đơn và phải dùng thuốc theo chỉ dẫn



Hãy để ý mọi tác dụng phụ mà quý vị gặp phải **và trao đổi với bác sĩ về các tác dụng phụ đó.** Đó có thể là dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng hơn hoặc đe dọa đến tính mạng. Đây không phải là toàn bộ tác dụng phụ mà quý vị có thể gặp phải khi sử dụng JEMPERLI. Các mẹo hay này chưa được chứng minh là có thể hỗ trợ khắc phục những tác dụng phụ được nêu trong tờ thông tin này.

Thông tin An toàn quan trọng (tiếp)

Việc điều trị y tế ngay lập tức có thể giúp ngăn những vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn.

HCP sẽ kiểm tra tình trạng của quý vị để phát hiện những vấn đề này trong quá trình điều trị bằng JEMPERLI và có thể dùng thuốc corticosteroid hoặc thuốc thay thế hormone để điều trị cho quý vị. Nếu quý vị gặp tác dụng phụ nghiêm trọng, HCP cũng có thể cần phải trì hoãn hoặc ngừng hẳn việc điều trị bằng JEMPERLI.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



Đây không phải là bệnh nhân thật đang dùng JEMPERLI.

Các tác dụng phụ có thể xảy ra liên quan đến JEMPERLI khi được dùng riêng (tiếp)

Buồn nôn

Hãy trao đổi với đội ngũ chăm sóc của quý vị về các khuyến nghị của họ để xử lý tình trạng buồn nôn. Các khuyến nghị này có thể bao gồm:

- Cố gắng tránh bỏ bữa hoặc bữa ăn nhẹ – dạ dày trống rỗng có thể khiến tình trạng buồn nôn trở nên xấu đi
- Luôn chuẩn bị sẵn bánh mì nướng khô, bánh quy giòn và các loại thức ăn nhạt khác
- Tránh đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ chiên, cay hoặc rất ngọt
- Chậm rãi nhấp từng ngụm chất lỏng suốt cả ngày
- Dùng thuốc điều trị chứng buồn nôn, đó có thể là thuốc kê đơn hoặc thuốc không kê đơn và phải dùng thuốc theo chỉ dẫn
- Thử áp dụng liệu pháp hương thơm, ví dụ như bạc hà



Hãy để ý mọi tác dụng phụ mà quý vị gặp phải **và trao đổi với bác sĩ về các tác dụng phụ đó**. Đó có thể là dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng hơn hoặc đe dọa đến tính mạng. Đây không phải là toàn bộ tác dụng phụ mà quý vị có thể gặp phải khi sử dụng JEMPERLI. Các mẹo hay này chưa được chứng minh là có thể hỗ trợ khắc phục những tác dụng phụ được nêu trong tờ thông tin này.

Thông tin An toàn quan trọng (tiếp)

Trước khi quý vị điều trị bằng JEMPERLI, hãy thông báo cho HCP về tất cả các tình trạng bệnh lý của quý vị, bao gồm các vấn đề về hệ thống miễn dịch như bệnh Crohn, viêm loét đại tràng hoặc lupus ban đỏ; quý vị đã được ghép tạng hay chưa; quý vị đã thực hiện hoặc có kế hoạch ghép tế bào gốc bằng tế bào gốc của người hiến tặng (đồng loài) không; quý vị đã được điều trị bằng phương pháp xạ trị ở vùng ngực chưa; quý vị có mắc một tình trạng bệnh lý nào ảnh hưởng đến hệ thần kinh không, chẳng hạn như bệnh nhược cơ hoặc hội chứng Guillain-Barré.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Các tác dụng phụ có thể xảy ra liên quan đến JEMPERLI khi được dùng riêng (tiếp)

Táo bón

Hãy trao đổi với đội ngũ chăm sóc của quý vị về các khuyến nghị của họ để kiểm soát tình trạng táo bón. Các khuyến nghị này có thể bao gồm:

- Cố gắng ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ như trái cây và rau củ tươi, yến mạch, bánh mì nguyên cám và gạo lứt
- Uống nhiều chất lỏng, nhưng hãy nhớ hỏi đội ngũ chăm sóc về lượng chất lỏng an toàn mà quý vị nên uống
- Luôn duy trì trạng thái năng động nhất có thể thông qua một kế hoạch tập thể dục phù hợp với quý vị
- Dùng thuốc điều trị táo bón, đó có thể là thuốc kê đơn hoặc thuốc không kê đơn và phải dùng thuốc theo chỉ dẫn

Nôn mửa

Hãy trao đổi với đội ngũ chăm sóc của quý vị về các khuyến nghị của họ để khắc phục tình trạng nôn mửa. Các khuyến nghị này có thể bao gồm:

- Tránh các loại thực phẩm nặng mùi hoặc có mùi khó chịu
- Chậm rãi nhấp từng ngụm chất lỏng cho đến khi quý vị cảm thấy đủ ổn để uống thêm
- Hãy trao đổi với đội ngũ chăm sóc của quý vị về cách duy trì trạng thái đủ nước và lượng nước an toàn mà quý vị nên uống



Hãy để ý mọi tác dụng phụ mà quý vị gặp phải **và trao đổi với bác sĩ về các tác dụng phụ đó**. Đó có thể là dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng hơn hoặc đe dọa đến tính mạng. Đây không phải là toàn bộ tác dụng phụ mà quý vị có thể gặp phải khi sử dụng JEMPERLI. Các mẹo hay này chưa được chứng minh là có thể hỗ trợ khắc phục những tác dụng phụ được nêu trong tờ thông tin này.

Thông tin An toàn quan trọng (tiếp)

Nếu quý vị đang mang thai hoặc có kế hoạch mang thai, hãy thông báo cho HCP. JEMPERLI có thể gây hại cho thai nhi. Nếu quý vị có khả năng mang thai, HCP sẽ yêu cầu quý vị thử thai trước khi bắt đầu điều trị. Quý vị nên dùng biện pháp tránh thai hiệu quả trong quá trình điều trị và trong 4 tháng sau liều JEMPERLI cuối cùng. Trong quá trình điều trị bằng JEMPERLI, hãy thông báo ngay cho HCP nếu quý vị có thai hoặc cho rằng mình có thể đã có thai.

Nếu quý vị đang cho con bú hoặc có kế hoạch cho con bú, hãy thông báo cho HCP. Chưa biết liệu JEMPERLI có truyền sang sữa mẹ hay không. Không cho con bú trong thời gian điều trị bằng JEMPERLI và trong vòng 4 tháng sau liều JEMPERLI cuối cùng.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Các tác dụng phụ có thể xảy ra liên quan đến JEMPERLI + CP



Mỗi người đều có trải nghiệm điều trị khác nhau. Do đó, điều quan trọng là quý vị cần trao đổi với bác sĩ khi bắt đầu gặp phải tác dụng phụ hoặc nếu tác dụng phụ xấu đi theo bất cứ hình thức nào. Vui lòng xem phần bên dưới để biết thêm thông tin về các mẹo hay mà đội ngũ chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể đề xuất để khắc phục một số tác dụng phụ nhất định, mặc dù đây không phải là tất cả các tác dụng phụ có thể xảy ra khi dùng JEMPERLI. **Hãy luôn thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về tất cả các tác dụng phụ quý vị có thể gặp phải và làm theo hướng dẫn của họ.**

Các vấn đề dây thần kinh ở tay, bàn tay, bàn chân và toàn bộ chân

Hãy trao đổi với đội ngũ chăm sóc của quý vị về các khuyến nghị của họ để khắc phục các vấn đề dây thần kinh. Các khuyến nghị này có thể bao gồm:

- Kiểm tra tay và chân thường xuyên để phát hiện bất kỳ thương tích, vết cắt hoặc chỗ đau nào
- Tránh hoặc hạn chế đồ uống có cồn
- Thực hiện các bài tập giãn cơ và giữ thẳng bằng nhẹ nhàng
- Bảo vệ bàn tay và bàn chân của quý vị khỏi nhiệt độ khắc nghiệt, ví dụ như đi giày và mặc quần áo ấm khi trời lạnh và bảo vệ tay khỏi sức nóng khi nấu ăn
- Ngăn ngừa té ngã bằng cách di chuyển chậm rãi ra khỏi đường đi và lắp thanh vịn trên tường và trong phòng tắm
- Đứng dậy chậm rãi sau khi ngồi hoặc nằm, đặc biệt là khi quý vị cảm thấy chóng mặt
- Dùng thuốc giảm đau, có thể bao gồm miếng dán hoặc kem bôi được kê đơn hoặc không kê đơn và phải dùng theo chỉ dẫn



Hãy để ý mọi tác dụng phụ mà quý vị gặp phải **và trao đổi với bác sĩ về các tác dụng phụ đó**. Đó có thể là dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng hơn hoặc đe dọa đến tính mạng. Các tác dụng phụ trong tờ thông tin này không phải là tất cả các tác dụng phụ mà quý vị có thể gặp phải khi sử dụng JEMPERLI. Các mẹo hay được nêu trong tờ hướng dẫn này chưa được chứng minh là có thể hỗ trợ khắc phục những tác dụng phụ này.

Thông tin An toàn quan trọng (tiếp)

Hãy thông báo cho HCP về mọi loại thuốc quý vị dùng, bao gồm thuốc kê đơn và không kê đơn, vitamin và thảo dược.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Các tác dụng phụ có thể xảy ra liên quan đến JEMPERLI + CP (tiếp)

Mệt mỏi

Hãy trao đổi với đội ngũ chăm sóc của quý vị về các khuyến nghị của họ để khắc phục tình trạng mệt mỏi. Các khuyến nghị này có thể bao gồm:

- Lập kế hoạch hoạt động trong ngày của quý vị để ưu tiên những việc quan trọng nhất và phân bổ các hoạt động trong suốt cả ngày
- Nghỉ ngơi hoặc ngủ trưa ngắn thay vì ngủ trưa lâu
- Lên kế hoạch tập thể dục phù hợp cho bản thân
- Đặt mục tiêu ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm
- Tránh những thứ làm gián đoạn giấc ngủ, ví dụ như caffeine và tập thể dục buổi tối

Buồn nôn

Hãy trao đổi với đội ngũ chăm sóc của quý vị về các khuyến nghị của họ để khắc phục tình trạng buồn nôn. Các khuyến nghị này có thể bao gồm:

- Cố gắng tránh bỏ bữa hoặc bữa ăn nhẹ – dạ dày trống rỗng có thể khiến tình trạng buồn nôn trở nên xấu đi
- Luôn chuẩn bị sẵn bánh mì nướng khô, bánh quy giòn và các loại thức ăn nhạt khác
- Tránh đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ chiên, cay hoặc rất ngọt
- Chậm rãi nhấp từng ngụm chất lỏng suốt cả ngày
- Dùng thuốc điều trị chứng buồn nôn, đó có thể là thuốc kê đơn hoặc thuốc không kê đơn và phải dùng thuốc theo chỉ dẫn
- Thử áp dụng liệu pháp hương thơm, ví dụ như bạc hà



Hãy để ý mọi tác dụng phụ mà quý vị gặp phải **và trao đổi với bác sĩ về các tác dụng phụ đó**. Đó có thể là dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng hơn hoặc đe dọa đến tính mạng. Đây không phải là toàn bộ tác dụng phụ mà quý vị có thể gặp phải khi sử dụng JEMPERLI. Các mẹo hay này chưa được chứng minh là có thể hỗ trợ khắc phục những tác dụng phụ được nêu trong tờ thông tin này.

Thông tin An toàn quan trọng (tiếp)

Các tác dụng phụ thường gặp nhất của JEMPERLI khi sử dụng kết hợp với carboplatin và paclitaxel bao gồm các vấn đề dây thần kinh ở cánh tay, bàn tay, cẳng chân và bàn chân; mệt mỏi; rụng tóc; đau khớp; phát ban; táo bón; tiêu chảy; đau dạ dày (bụng); khó thở; chán ăn; nhiễm trùng đường tiết niệu; nôn mửa.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Các tác dụng phụ có thể xảy ra liên quan đến JEMPERLI + CP (tiếp)

Rụng tóc

Hãy trao đổi với đội ngũ chăm sóc của quý vị về các khuyến nghị của họ để khắc phục tình trạng rụng tóc. Các khuyến nghị này có thể bao gồm:

- Xác định khả năng rụng tóc và thời điểm bắt đầu rụng tóc
- Hiểu và thừa nhận rằng việc cảm thấy lo lắng về tình trạng rụng tóc là cảm giác tự nhiên và một số người chọn cách cắt tóc ngắn hoặc cạo trọc đầu trước khi tình trạng rụng tóc bắt đầu xảy ra
- Thử dùng tóc giả, khăn quàng cổ và mũ để xem quý vị ưa thích lựa chọn nào hơn nếu cảm thấy lựa chọn đó phù hợp với bản thân

Đau khớp

Hãy trao đổi với đội ngũ chăm sóc của quý vị về các khuyến nghị của họ để khắc phục tình trạng đau khớp. Các khuyến nghị này có thể bao gồm:

- Đắp túi chườm lạnh, túi đá chườm hoặc gói rau đông lạnh vào vùng bị đau trong 15 đến 20 phút, thực hiện vài lần mỗi ngày
- Đeo đai quấn nóng, ngâm mình trong bồn nước ấm hoặc tắm nước ấm bằng vòi hoa sen để thư giãn cơ và tăng lưu lượng máu
- Thăm khám với chuyên gia vật lý trị liệu – người có thể hướng dẫn quý vị thực hiện các bài tập giãn cơ nhẹ nhàng để giảm căng cơ
- Dùng thuốc giảm đau, đó có thể là thuốc kê đơn hoặc thuốc không kê đơn và phải dùng thuốc theo chỉ dẫn



Hãy để ý mọi tác dụng phụ mà quý vị gặp phải **và trao đổi với bác sĩ về các tác dụng phụ đó**. Đó có thể là dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng hơn hoặc đe dọa đến tính mạng. Đây không phải là toàn bộ tác dụng phụ mà quý vị có thể gặp phải khi sử dụng JEMPERLI. Các mẹo hay này chưa được chứng minh là có thể hỗ trợ khắc phục những tác dụng phụ được nêu trong tờ thông tin này.

Thông tin An toàn quan trọng (tiếp)

Các tác dụng phụ thường gặp nhất của JEMPERLI khi sử dụng riêng bao gồm mệt mỏi và suy nhược, giảm số lượng hồng cầu (thiếu máu), tiêu chảy, buồn nôn, táo bón, nôn mửa.

Đây không phải toàn bộ tác dụng phụ có thể xảy ra của JEMPERLI. Hãy gọi cho bác sĩ của quý vị để được tư vấn y tế về các tác dụng phụ.

Quý vị nên báo cáo các tác dụng phụ bất lợi của thuốc kê đơn cho FDA bằng cách gọi đến số 1-800-FDA-1088 hoặc truy cập vào trang www.fda.gov/medwatch.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



Các tác dụng phụ có thể xảy ra liên quan đến JEMPERLI + CP (tiếp)

Phát ban

Hãy trao đổi với đội ngũ chăm sóc của quý vị về các khuyến nghị của họ để khắc phục tình trạng phát ban. Các khuyến nghị này có thể bao gồm:

- Sử dụng kem dưỡng ẩm và kem dưỡng da nhẹ
- Sử dụng xà phòng nhẹ và vải mềm để nhẹ nhàng vệ sinh vùng bị phát ban
- Bảo vệ vùng bị phát ban khỏi các yếu tố nóng và lạnh
- Tránh xa ánh nắng mặt trời nhiều nhất có thể
- Dùng thuốc điều trị phát ban, đó có thể là thuốc kê đơn hoặc thuốc không kê đơn và phải dùng thuốc theo chỉ dẫn



Hãy để ý mọi tác dụng phụ mà quý vị gặp phải **và trao đổi với bác sĩ về các tác dụng phụ đó**. Đó có thể là dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng hơn hoặc đe dọa đến tính mạng. Đây không phải là toàn bộ tác dụng phụ mà quý vị có thể gặp phải khi sử dụng JEMPERLI. Các mẹo hay này chưa được chứng minh là có thể hỗ trợ khắc phục những tác dụng phụ được nêu trong tờ thông tin này.

Thông tin An toàn quan trọng

JEMPERLI là loại thuốc có thể điều trị một số bệnh ung thư bằng cách tác động lên hệ miễn dịch của quý vị. JEMPERLI có thể khiến hệ miễn dịch của quý vị tấn công các cơ quan và mô bình thường tại bất kỳ phần nào trong cơ thể và có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan/mô đó. Những vấn đề này đôi khi có thể trở nên nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng và có thể dẫn đến tử vong. Quý vị có thể gặp nhiều vấn đề cùng một lúc. Những vấn đề này có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong quá trình điều trị hoặc thậm chí sau khi quá trình điều trị kết thúc.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Các tác dụng phụ có thể xảy ra liên quan đến JEMPERLI + CP (tiếp)

Táo bón

Hãy trao đổi với đội ngũ chăm sóc của quý vị về các khuyến nghị của họ để khắc phục tình trạng táo bón. Các khuyến nghị này có thể bao gồm:

- Cố gắng ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ như trái cây và rau củ tươi, yến mạch, bánh mì nguyên cám và gạo lứt
- Uống nhiều chất lỏng, nhưng hãy nhớ hỏi đội ngũ chăm sóc về lượng chất lỏng an toàn mà quý vị nên uống
- Luôn duy trì trạng thái năng động nhất có thể thông qua một kế hoạch tập thể dục phù hợp với quý vị
- Dùng thuốc điều trị táo bón, đó có thể là thuốc kê đơn hoặc thuốc không kê đơn và phải dùng thuốc theo chỉ dẫn

Tiêu chảy

Hãy trao đổi với đội ngũ chăm sóc của quý vị về các khuyến nghị của họ để khắc phục tình trạng tiêu chảy. Các khuyến nghị này có thể bao gồm:

- Tránh đồ ăn chiên rán và đồ ăn giàu chất xơ như đậu và ngũ cốc nguyên cám
- Giảm thiểu việc sử dụng đồ uống có cồn hoặc thuốc lá
- Dùng thuốc điều trị tiêu chảy, đó có thể là thuốc kê đơn hoặc thuốc không kê đơn và phải dùng thuốc theo chỉ dẫn



Hãy để ý mọi tác dụng phụ mà quý vị gặp phải **và trao đổi với bác sĩ về các tác dụng phụ đó**. Đó có thể là dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng hơn hoặc đe dọa đến tính mạng. Đây không phải là toàn bộ tác dụng phụ mà quý vị có thể gặp phải khi sử dụng JEMPERLI. Các mẹo hay này chưa được chứng minh là có thể hỗ trợ khắc phục những tác dụng phụ được nêu trong tờ thông tin này.

Thông tin An toàn quan trọng (tiếp)

Hãy gọi điện hoặc gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (HCP) ngay nếu quý vị có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào mới hoặc xấu đi, bao gồm:

Các vấn đề về phổi. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm ho, khó thở hoặc đau ngực.

Các vấn đề về tiêu hóa. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm tiêu chảy hoặc đi ngoài nhiều hơn bình thường; phân có màu đen, hắc ín, dính hoặc có máu hay chất nhầy; hoặc quý vị thấy đau dữ dội ở bên trong dạ dày (bụng) hoặc đau dữ dội khi ấn vào vùng bụng.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Các tác dụng phụ có thể xảy ra liên quan đến JEMPERLI + CP (tiếp)

Chán ăn

Hãy trao đổi với đội ngũ chăm sóc của quý vị về các khuyến nghị của họ để khắc phục tình trạng chán ăn. Các khuyến nghị này có thể bao gồm:

- Cố gắng ăn với lượng nhỏ thường xuyên hơn, đồng thời, tận dụng những thời điểm đói bụng để ăn nhiều hơn nếu quý vị cảm thấy no sau khi ăn một lượng nhỏ
- Luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ để quý vị có thể ăn khi muốn
- Hỏi chuyên gia dinh dưỡng về sữa lắc và hỗn hợp đồ uống hòa tan uống liền
- Lên lịch trình bữa ăn, thay vì chỉ ăn khi quý vị cảm thấy đói



Hãy để ý mọi tác dụng phụ mà quý vị gặp phải **và trao đổi với bác sĩ về các tác dụng phụ đó**. Đó có thể là dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng hơn hoặc đe dọa đến tính mạng. Đây không phải là toàn bộ tác dụng phụ mà quý vị có thể gặp phải khi sử dụng JEMPERLI. Các mọ hay này chưa được chứng minh là có thể hỗ trợ khắc phục những tác dụng phụ được nêu trong tờ thông tin này.

Thông tin An toàn quan trọng (tiếp)

Hãy gọi điện hoặc gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (HCP) ngay nếu quý vị có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào mới hoặc xấu đi, bao gồm (tiếp):

Các vấn đề về gan. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm vàng da hoặc lòng trắng mắt chuyển màu vàng, buồn nôn hoặc nôn dữ dội, đau ở bên phải vùng dạ dày (bụng), nước tiểu sẫm màu (màu trà), dễ chảy máu hoặc bầm tím hơn bình thường.

Các vấn đề về tuyến nội tiết. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm đau đầu không khỏi hoặc đau đầu bất thường, mắt nhạy cảm với ánh sáng, các vấn đề về mắt, nhịp tim nhanh, đổ mồ hôi nhiều, mệt mỏi cực độ, tăng cân hoặc giảm cân, cảm thấy đói hoặc khát nhiều hơn bình thường, đi tiểu thường xuyên hơn bình thường, rụng tóc, cảm thấy ớn lạnh, táo bón, giọng nói trầm hơn, chóng mặt hoặc ngất xỉu, thay đổi tâm trạng hoặc hành vi như giảm ham muốn tình dục, cáu kỉnh hoặc hay quên.

Các vấn đề về thận. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm thay đổi về lượng hoặc màu sắc nước tiểu, nước tiểu có máu, sưng mắt cá chân hoặc chán ăn.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Các tác dụng phụ có thể xảy ra liên quan đến JEMPERLI + CP (tiếp)

Viêm đường tiết niệu (UTI)

Hãy trao đổi với đội ngũ chăm sóc của quý vị về các khuyến nghị của họ để khắc phục tình trạng viêm đường tiết niệu. Các khuyến nghị này có thể bao gồm:

- Uống nhiều chất lỏng, sao cho nước tiểu có màu vàng nhạt hoặc trong, nhưng hãy nhớ hỏi đội ngũ chăm sóc về lượng chất lỏng an toàn mà quý vị nên uống
- Tránh những thứ có thể làm cho các vấn đề ở bàng quang trở nên xấu đi, ví dụ như đồ uống có chứa caffeine, đồ uống có cồn, đồ ăn cay và các sản phẩm từ thuốc lá
- Ngăn ngừa tình trạng viêm đường tiết niệu bằng cách đi vệ sinh thường xuyên, mặc đồ lót làm từ cotton và quần rộng rãi, đồng thời tắm vòi sen thay vì tắm bồn
- Dùng thuốc theo khuyến nghị từ đội ngũ chăm sóc của quý vị

Nôn mửa

Hãy trao đổi với đội ngũ chăm sóc của quý vị về các khuyến nghị của họ để khắc phục tình trạng nôn mửa. Các khuyến nghị này có thể bao gồm:

- Tránh các loại thực phẩm nặng mùi hoặc có mùi khó chịu
- Chậm rãi nhấp từng ngụm chất lỏng cho đến khi quý vị cảm thấy đủ ổn để uống thêm
- Hãy trao đổi với đội ngũ chăm sóc của quý vị về cách duy trì trạng thái đủ nước và lượng nước an toàn mà quý vị nên uống



Hãy để ý mọi tác dụng phụ mà quý vị gặp phải **và trao đổi với bác sĩ về các tác dụng phụ đó**. Đó có thể là dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng hơn hoặc đe dọa đến tính mạng. Đây không phải là toàn bộ tác dụng phụ mà quý vị có thể gặp phải khi sử dụng JEMPERLI. Các mẹo hay này chưa được chứng minh là có thể hỗ trợ khắc phục những tác dụng phụ được nêu trong tờ thông tin này.

Thông tin An toàn quan trọng (tiếp)

Hãy gọi điện hoặc gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (HCP) ngay nếu quý vị có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào mới hoặc xấu đi, bao gồm (tiếp):

Các vấn đề về da. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm phát ban; ngứa; da phồng rộp hoặc bong tróc; sưng hạch bạch huyết; xuất hiện vết loét hoặc vết đau ở miệng hoặc mũi, họng hoặc bộ phận sinh dục; sốt hoặc các triệu chứng giống như cúm.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



Quý vị muốn có thêm tài nguyên có thể giúp ích cho quá trình điều trị của mình?

Hãy truy cập vào
JEMPERLI.com

Đây không phải là bệnh nhân thật đang dùng JEMPERLI.

Thông tin An toàn quan trọng (tiếp)

Các vấn đề cũng có thể xảy ra tại các cơ quan và mô khác. Đây không phải là tất cả các dấu hiệu và triệu chứng của các vấn đề về hệ thống miễn dịch có thể xảy ra với JEMPERLI. Hãy gọi điện hoặc gặp HCP ngay nếu có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng mới hoặc trở nặng nào. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm đau ngực, nhịp tim không đều, khó thở, sưng mắt cá chân; lú lẫn, buồn ngủ, vấn đề về trí nhớ, thay đổi tâm trạng hoặc hành vi, cứng cổ, vấn đề mất thăng bằng, ngứa ran hoặc tê bì ở tay hoặc chân; song thị, mờ mắt, nhạy cảm với ánh sáng, đau mắt, thay đổi thị lực; đau cơ dai dẳng hoặc nghiêm trọng hay yếu cơ, chuột rút cơ; giảm số lượng hồng cầu, bầm tím.

Những phản ứng tiêm truyền mà đôi khi có thể trở nên nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng. Các dấu hiệu và triệu chứng của phản ứng tiêm truyền có thể bao gồm ớn lạnh hoặc run rẩy, ngứa hoặc phát ban, đỏ mặt, khó thở hoặc thở khò khè, chóng mặt, có cảm giác sắp ngất xỉu, sốt, đau lưng hoặc đau cổ.

Thải tạng ghép. HCP sẽ cho biết quý vị nên báo cáo những dấu hiệu và triệu chứng nào và theo dõi tình trạng của quý vị, tùy thuộc vào loại tạng quý vị được ghép.

Vui lòng xem thêm Thông tin An toàn quan trọng xuyên suốt tài liệu, cũng như [Thông tin kê đơn](#) đầy đủ, kể cả [Hướng dẫn dùng thuốc](#), các tài liệu này cũng có trên JEMPERLI.com.

Các nhãn hiệu đều thuộc sở hữu của hoặc đã được cấp phép cho nhóm các công ty GSK.

GSK

©2024 GSK or licensor.
PMUS-DSTBROC240081 December 2024
Produced in USA.

Tên tập tin: Vietnamese Side Effects Guide

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg