



并非真正使用 JEMPERLI 的患者。

在整个治疗过程中 照顾好自己*

*本信息不能替代医疗保健提供者的建议。请务必与您的医疗团队讨论您的疑虑和问题。

请参阅全文中的重要安全信息，以及完整[处方信息](#)
(包括[用药指南](#))，也可在 JEMPERLI.com 上获取。

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



目录

重要安全信息	3	好好照顾自己	12
规划未来道路	6	面对情感挑战	13
积极参与自己的护理	8	其他在线资源	14
您在治疗过程中可能会遇到的情况	10		

批准适应症

JEMPERLI 是一种处方药，用于治疗患有以下疾病的成人患者：

- 一种被称为子宫内膜癌 (EC) 的子宫癌症
- 在以下情况下，JEMPERLI 可与化疗药物卡铂和紫杉醇联合使用，之后，JEMPERLI 可单独使用：
 - 当癌症扩散到子宫外（晚期）时或者
 - 癌症复发时。
- 在以下情况下，JEMPERLI 可单独使用：
 - 当实验室检查显示肿瘤存在错配修复缺陷 (dMMR)，并且
 - 您的癌症复发或已经扩散（晚期 EC），并且
 - 您接受了含有铂的化疗，但该疗法无效或不再有效，并且
 - 您的癌症无法通过手术或放射治疗。

尚不清楚 JEMPERLI 对儿童是否安全有效。

重要安全信息

JEMPERLI 是一种可以通过与免疫系统协同作用来治疗某些癌症的药物。JEMPERLI 可导致您的免疫系统攻击身体任何部位的正常器官和组织，并影响这些器官和组织的工作方式。这些问题有时会变得严重或危及生命，并可能导致死亡。您可能同时出现多个这样的问题。这些问题可能在治疗期间的任何时候发生，甚至在治疗结束之后也可能发生。

请参阅全文中的其他重要安全信息，以及完整[处方信息](#)（包括[用药指南](#)），也可在 JEMPERLI.com 上获取。

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

重要安全信息（续）

如果您出现任何新的或恶化的体征或症状，请立即致电医疗保健提供者 (HCP) 或在 HCP 处就诊，包括：

肺部问题。 体征和症状可能包括咳嗽、呼吸短促或胸痛。

肠道问题。 体征和症状可能包括腹泻或排便次数比平时多；粪便呈黑色、柏油状、粘稠状，或带有血液或粘液；或严重的胃部（腹部）疼痛或压痛。

肝脏问题。 体征和症状可能包括皮肤或眼白发黄、严重的恶心或呕吐、胃部（腹部）右侧疼痛、尿液呈深色（茶色），或比平时更容易出血或瘀伤。

激素腺问题。 体征和症状可能包括持续的头痛或不寻常的头痛、眼睛对光敏感、眼睛问题、心跳加快、出汗增多、极度疲倦、体重升高或体重下降、感觉比平时更饥饿或更口渴、小便比平时更频繁、脱发、感觉寒冷、便秘、声音变得更低沉、头晕或昏厥、情绪或行为发生变化（如性欲减退、易激惹或健忘）。

肾脏问题。 体征和症状可能包括尿量或尿液颜色发生变化、尿液中有血、脚踝肿胀或无食欲。

皮肤问题。 体征和症状可能包括皮疹；瘙痒；皮肤水疱或脱皮；淋巴结肿胀；口腔、鼻子、喉咙或生殖器部位出现疼痛的疮或溃疡；发热或流感样症状。

其他器官和组织也可能出现问题。这些并不是 JEMPERLI 可能出现的所有免疫系统问题体征和症状。如果出现任何新的或更严重的体征或症状，请立即致电 HCP 或在 HCP 处就诊。

体征和症状可能包括胸痛、心律不齐、呼吸短促、脚踝肿胀；意识模糊、嗜睡、记忆力问题、情绪或行为变化、颈部僵硬、平衡问题、手臂或腿部刺痛或麻木；复视、视物模糊、对光敏感、眼睛疼痛、视力变化；持续或严重的肌肉疼痛或无力、肌肉痉挛；红细胞减少、瘀伤。

输液反应有时会很严重甚至危及生命。 输液反应的体征和症状可能包括发冷或发抖、瘙痒或皮疹、潮红、呼吸短促或哮喘、头晕、感觉像要晕过去、发热、背部或颈部疼痛。

移植器官排斥。 您的 HCP 应根据您所接受的器官移植类型，告诉您应该报告哪些体征和症状，并对您进行监测。

请参阅全文中的其他重要安全信息，以及完整**处方信息**（包括**用药指南**），也可在 JEMPERLI.com 上获取。

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

重要安全信息（续）

接受使用供体干细胞（同种异体）的骨髓（干细胞）移植的人群的并发症，包括移植物抗宿主病 (GVHD)。 这些并发症可能很严重，甚至可能导致死亡。如果您在接受 JEMPERLI 治疗之前或之后接受移植，可能会发生这些并发症。您的 HCP 将监测您是否出现这些并发症。

立即接受治疗有助于防止这些问题变得更加严重。 在使用 JEMPERLI 治疗期间，您的 HCP 将检查您是否存在这些问题，并可能使用皮质类固醇或激素替代药物对您进行治疗。如果您出现严重的副作用，HCP 可能还需要延迟或完全停止 JEMPERLI 治疗。

在接受 JEMPERLI 治疗之前，告知 HCP 您的所有病症，包括： 免疫系统问题，如克罗恩病、溃疡性结肠炎或狼疮；接受过器官移植；接受过或计划接受使用供体干细胞（同种异体）的干细胞移植；接受过胸部放射治疗；患有影响神经系统的疾病，如重症肌无力或格林巴利综合征。

如果您已经怀孕或正在备孕，请告知您的 HCP。 JEMPERLI 可能会伤害未出生的婴儿。如果您能够怀孕，在您开始治疗之前，HCP 将为您进行妊娠试验。在治疗期间以及最后一次 JEMPERLI 给药后 4 个月内使用有效的避孕措施。如果您在接受 JEMPERLI 治疗期间怀孕，或者您认为您可能怀孕，请立即告知您的 HCP。

如果您正在哺乳或计划哺乳，请告知您的 HCP。JEMPERLI 是否会进入母乳，目前尚不清楚。在 JEMPERLI 治疗期间以及最后一次给药后 4 个月内不要哺乳。

告知 HCP 您服用的所有药物， 包括处方药和非处方药、维生素和草药补充剂。

JEMPERLI 与卡铂和紫杉醇联合使用时最常见的副作用 包括：手臂、手、腿和脚的神经问题；疲倦；恶心；脱发；关节疼痛；皮疹；便秘；腹泻；胃部（腹部）疼痛；呼吸短促；食欲下降；尿路感染；呕吐。

JEMPERLI 单独使用时最常见的副作用 包括：疲倦和无力、红细胞计数低（贫血）、腹泻、恶心、便秘、呕吐。

这些并非 JEMPERLI 的所有可能副作用。请致电您的医生，征求有关副作用的医疗建议。

我们鼓励您拨打 1-800-FDA-1088 或访问 www.fda.gov/medwatch 向 FDA 报告处方药的不良副作用。

请参阅完整**处方信息**（包括**用药指南**），也可在 JEMPERLI.com 上获取。



并非真正使用 JEMPERLI 的患者。

重要安全信息

JEMPERLI 是一种可以通过与免疫系统协同作用来治疗某些癌症的药物。JEMPERLI 可导致您的免疫系统攻击身体任何部位的正常器官和组织，并影响这些器官和组织的工作方式。这些问题有时会变得严重或危及生命，并可能导致死亡。您可能同时出现多个这样的问题。这些问题可能在治疗期间的任何时候发生，甚至在治疗结束之后也可能发生。

请参阅全文中的其他重要安全信息，以及完整[处方信息](#)（包括[用药指南](#)），也可在 [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com) 上获取。

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

规划未来道路



当您被诊断出患有晚期或复发性子宫内膜癌，未来可能会显得像一个巨大的未知数。在您的旅程中，您可能会有各种问题和复杂的情绪。



我们想要为您提供帮助。

我们期望通过向您提供详尽的子宫内膜癌相关知识以及您可能面临的种种情况，助您减少未知。

关于子宫内膜癌

子宫内膜癌是：

- 始于子宫内膜组织的癌症
- 美国最常见的妇科恶性肿瘤



在美国，每年约有
6.1 万例

子宫内膜癌确诊病例

“晚期或复发”是什么意思？

“晚期或复发”是指子宫内膜癌已扩散到子宫外或治疗后复发。和您一样，大约四分之一的子宫内膜癌患者患有晚期或复发的癌症。

重要安全信息（续）

如果您出现任何新的或恶化的体征或症状，请立即致电医疗保健提供者 (HCP) 或在 HCP 处就诊，包括：

肺部问题。 体征和症状可能包括咳嗽、呼吸短促或胸痛。

肠道问题。 体征和症状可能包括腹泻或排便次数比平时多；粪便呈黑色、柏油状、粘稠状，或带有血液或粘液；或严重的胃部（腹部）疼痛或压痛。

肝脏问题。 体征和症状可能包括皮肤或眼白发黄、严重的恶心或呕吐、胃部（腹部）右侧疼痛、尿液呈深色（茶色），或比平时更容易出血或瘀伤。

请参阅全文中的其他重要安全信息，以及完整**处方信息**（包括**用药指南**），也可在 JEMPERLI.com 上获取。

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



护理团队概述

虽然您的肿瘤科医生将主导您的治疗计划，但整个专家团队将为您提供护理并回答您的问题。他们可能包括：

监督护理和治疗

- 肿瘤内科医生
- 妇科肿瘤科医生
- 肿瘤外科医生
- 肿瘤科医生助理 (PA)

管理额外护理

- 患者导航员
- 姑息治疗团队
- 临床社工
- 心理健康专业人员

提供日常护理

- 肿瘤科执业护士 (NP)
- 肿瘤科护士
- 病例管理经理
- 输液护士

其他团队成员

- 营养师/营养学家
- 放射科医生
- 康复治疗师
- 肿瘤科临床药剂师

重要安全信息（续）

如果您出现任何新的或恶化的体征或症状，请立即致电医疗保健提供者 (HCP) 或在 HCP 处就诊，包括（续）：

激素腺问题。 体征和症状可能包括持续的头痛或不寻常的头痛、眼睛对光敏感、眼睛问题、心跳加快、出汗增多、极度疲倦、体重升高或体重下降、感觉比平时更饥饿或更口渴、小便比平时更频繁、脱发、感觉寒冷、便秘、声音变得更低沉、头晕或昏厥、情绪或行为发生变化（如性欲减退、易激惹或健忘）。

请参阅全文中的其他重要安全信息，以及完整**处方信息**（包括**用药指南**），也可在 JEMPERLI.com 上获取。

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

积极参与自己的护理

您是您的医疗团队中最重要成员！ 要满足您的需求，首先要让别人听到您的声音。因此，不要害怕提出问题和表达您的偏好。

在整个治疗过程中发挥积极作用：



可以帮助您了解这种复杂的疾病和治疗目标



可以让您更好地应对可能出现的副作用



可以让您感觉更能掌控自己的状况

请记住，一开始您可能无法吸收或理解所有内容，这很正常。若您感到疲惫不堪或压力重重，可以随时要求我们重复提供信息。

寻求帮助

意识到自己无法独立完成所有事情可能会很困难。寻求帮助也并不容易。但是，子宫内膜癌和治疗过程可能会让人精疲力竭。在这个充满挑战的时期，让他人为您提供所需的支持是可以的。



要点提示

如果在就诊时无法做笔记，向护理团队索取最重要信息的打印件。

重要安全信息（续）

如果您出现任何新的或恶化的体征或症状，请立即致电医疗保健提供者 (HCP) 或在 HCP 处就诊，包括（续）：

肾脏问题。 体征和症状可能包括尿量或尿液颜色发生变化、尿液中有血、脚踝肿胀或无食欲。

皮肤问题。 体征和症状可能包括皮疹；瘙痒；皮肤水疱或脱皮；淋巴结肿胀；口腔、鼻子、喉咙或生殖器部位出现疼痛的疮或溃疡；发热或流感样症状。

请参阅全文中的其他重要安全信息，以及完整**处方信息**（包括**用药指南**），也可在 JEMPERLI.com 上获取。

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



并非真正使用 JEMPERLI 的患者。

重要安全信息（续）

其他器官和组织也可能出现问题。这些并不是 **JEMPERLI** 可能出现的所有免疫系统问题体征和症状。如果出现任何新的或更严重的体征或症状，请立即致电 **HCP** 或在 **HCP** 处就诊。体征和症状可能包括胸痛、心律不齐、呼吸短促、脚踝肿胀；意识模糊、嗜睡、记忆力问题、情绪或行为变化、颈部僵硬、平衡问题、手臂或腿部刺痛或麻木；复视、视物模糊、对光敏感、眼睛疼痛、视力变化；持续或严重的肌肉疼痛或无力、肌肉痉挛；红细胞减少、瘀伤。

请参阅全文中的其他重要安全信息，以及完整**处方信息**（包括**用药指南**），也可在 JEMPERLI.com 上获取。

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

您在治疗过程中可能会遇到的情况

确诊后，您将安排医疗预约、血液检查并接受治疗。您可能还要接受检查和扫描。这一切似乎让人不知所措，但循序渐进可能会让您能更轻松应对。

就诊——一旦和您的肿瘤科医生就治疗方案达成一致，您很可能会开始与护理团队成员会面。他们将讨论您的饮食、经济和支持需求，以及您的治疗目标。您可以分享对您来说最重要的事情，无论是家庭生活、事业还是最喜欢的活动。您可以相信，护理团队会很乐意与您讨论您对未来的任何担忧。

检查——每个治疗方案都不尽相同，但大多数子宫内膜癌患者在整个治疗过程中都会接受类似的检查。请联系您的护理团队，了解您可能需要或已经进行了哪些检查。这些检查可能包括：

- **活检**——切除一小块组织进行检测的程序
- **生物标志物检测**——实验室检测，以查看您的肿瘤是否含有某些基因、蛋白质或其他因子，这些基因、蛋白质或因子可提供有关您癌症的重要信息，并可帮助您的医生决定哪些治疗方案（包括 JEMPERLI）可能适合您
- **CT 扫描（计算机断层扫描）**——显示内脏器官的影像
- **阴道镜检查**——一种评估宫颈细胞的程序
- **扩张宫颈与刮宫术 (D&C)**——从子宫中取出一小块组织进行检测的手术
- **妇科检查或盆腔检查**——医生检查子宫、阴道、卵巢和直肠，寻找任何异常发现
- **磁共振成像 (MRI)**——使用无线电波和强磁铁提供身体内部详细图像的扫描
- **PET 扫描（正电子发射断层成像）**——显示癌细胞位置的影像
- **超声**——使用声波创建内脏器官的图像

重要安全信息（续）

输液反应有时会很严重甚至危及生命。输液反应的体征和症状可能包括发冷或发抖、瘙痒或皮疹、潮红、呼吸短促或哮喘、头晕、感觉像要晕过去、发热、背部或颈部疼痛。

移植器官排斥。您的 HCP 应根据您所接受的器官移植类型，告诉您应该报告哪些体征和症状，并对您进行监测。

请参阅全文中的其他重要安全信息，以及完整**处方信息**（包括**用药指南**），也可在 JEMPERLI.com 上获取。

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

使用 JEMPERLI 进行治疗

JEMPERLI 是一种已获批用于治疗您这种类型的晚期或复发性子宫内膜癌的免疫疗法。这意味着其旨在与人体免疫系统协同发现并攻击癌细胞。



根据您在治疗过程中所处的阶段，您的医生可能会开具以下处方：

- JEMPERLI 与化疗药物卡铂和紫杉醇联合使用，然后单独使用 JEMPERLI，以多种方式攻击癌症
- 单独使用 JEMPERLI

您的医疗保健提供者将决定您需要多少次治疗，并检查您是否有副作用。如果您错过了任何预约，请尽快致电您的医疗保健提供者重新安排预约时间。



治疗当天需要注意些什么：

- JEMPERLI 是通过静脉注射（IV）的方式，直接将药物输送到您的静脉中
- 输液时间约为 30 分钟
- 您可能会感到寒冷，因此请带上毯子、毛衣或加热垫
- 在当天剩下的时间里，您可能需要休息一下
- 如果您希望照护伙伴陪同您一起，请咨询输液中心工作人员是否可以



要点提示

查看本手册中的重要安全信息。如果出现任何新的或恶化的体征或症状，立即致电医疗保健提供者或在医疗保健提供者处就诊，因为这些可能是其他更严重或危及生命的问题的征兆。访问 JEMPERLI.com 了解有关副作用的更多信息。

重要安全信息（续）

接受使用供体干细胞（同种异体）的骨髓（干细胞）移植的人群的并发症，包括移植物抗宿主病（GVHD）。这些并发症可能很严重，甚至可能导致死亡。如果您在接受 JEMPERLI 治疗之前或之后接受移植，可能会发生这些并发症。您的 HCP 将监测您是否出现这些并发症。

请参阅全文中的其他重要安全信息，以及完整处方信息（包括[用药指南](#)），也可在 JEMPERLI.com 上获取。

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

好好照顾自己

在癌症治疗期间，您的免疫系统将会更加辛勤地工作，以对抗疾病。您可能想知道如何在整个治疗过程中照顾好自己。请向您的护理团队咨询相关建议，其中可能包括：



改善营养—与护理团队讨论营养目标以及哪些食物可以为您提供正确的蛋白质、维生素和矿物质组合。良好饮食可能有助于提高您的能量水平。



多喝水—除了水之外，您还可以根据护理团队的建议，适量饮用果汁、电解质饮料以及其他不含咖啡因的液体来补充流失的水分。不过，请务必咨询您的护理团队，以确定安全适宜的饮水量。



充足休息—每晚尽量保证 7 到 8 小时的睡眠时间，这将有助于您恢复活力，精神焕发。



保持活动—尽量每天保持活动。每天散步可能有助于改善您的情绪。在开始任何新的锻炼计划之前，一定要咨询您的医疗团队，讨论适合您的活动量。



要点提示

您不必独自面对。您可以在网上找到支持小组（请参阅第 14 页的列表）或联系您的护理团队。他们了解您的感受，并有资源可以帮助您。

重要安全信息（续）

立即接受治疗有助于防止这些问题变得更加严重。在使用 JEMPERLI 治疗期间，您的 HCP 将检查您是否存在这些问题，并可能使用皮质类固醇或激素替代药物对您进行治疗。如果您出现严重的副作用，HCP 可能还需要延迟或完全停止 JEMPERLI 治疗。

在接受 JEMPERLI 治疗之前，告知 HCP 您的所有病症，包括：免疫系统问题，如克罗恩病、溃疡性结肠炎或狼疮；接受过器官移植；接受过或计划接受使用供体干细胞（同种异体）的干细胞移植；接受过胸部放射治疗；患有影响神经系统的疾病，如重症肌无力或格林巴利综合征。

请参阅全文中的其他重要安全信息，以及完整**处方信息**（包括**用药指南**），也可在 JEMPERLI.com 上获取。

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

面对情感挑战

在治疗过程中，您可能会感到焦虑或压力。您的护理团队可以指导您找到可以帮助您的资源。

焦虑的迹象有很多，其中一些可能与 JEMPERLI 的副作用有关。这些迹象可能以多种形式出现，因此**与您的护理团队讨论您可能感受到的任何变化至关重要。**

如果您注意到任何压力迹象，请采取措施保护您的心理健康。向您的护理团队咨询帮助管理压力的方法—他们可能会提出以下建议：

- 打电话给朋友倾诉
- 冥想或练习深呼吸（寻找可以教您如何做的应用程序）
- 做 10 分钟瑜伽（寻找在线视频）
- 尝试芳香疗法，使用精油和室内扩散器或棉球
- 联系支持小组
- 散步
- 联系咨询师或治疗师



要点提示

在治疗期间，您可能会感觉不适，但即使是一点活动也可能让您感觉更舒适。**在开始任何新的锻炼计划之前，一定要咨询您的护理团队。**

重要安全信息（续）

如果您已经怀孕或正在备孕，请告知您的 HCP。 JEMPERLI 可能会伤害未出生的婴儿。如果您能够怀孕，在您开始治疗之前，HCP 将为您进行妊娠试验。在治疗期间以及最后一次 JEMPERLI 给药后 4 个月内使用有效的避孕措施。如果您在接受 JEMPERLI 治疗期间怀孕，或者您认为您可能怀孕，请立即告知您的 HCP。

如果您正在哺乳或计划哺乳，请告知您的 HCP。JEMPERLI 是否会进入母乳，目前尚不清楚。在 JEMPERLI 治疗期间以及最后一次给药后 4 个月内不要哺乳。

请参阅全文中的其他重要安全信息，以及完整**处方信息**（包括**用药指南**），也可在 JEMPERLI.com 上获取。

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



其他在线资源

有关癌症的信息

American Cancer Society
(美国癌症协会)
cancer.org

**Facing Hereditary Cancer
EMPOWERED (FORCE)**
facingourrisk.org

请注意：这些资源为 GSK 外部资源。GSK 无法控制这些资源所提供的内容或信息，因此不保证其准确性或完整性。这些组织（包括美国癌症协会）不为任何产品或服务背书。

支持和宣传

CancerCare (癌症护理)
cancercares.org

**Endometrial Cancer Action Network
for African-Americans (非裔美国人子宫内膜癌行动网络, ECANA)**
ecanawomen.org

Foundation for Women's Cancer (妇女癌症基金会) foundationforwomenscancer.org

Patient Empowerment Network (患者赋权网络)
powerfulpatients.org

SHARE Cancer Support (分享癌症支持)
sharecancersupport.org

重要安全信息（续）

告知 HCP 您服用的所有药物，包括处方药和非处方药、维生素和草药补充剂。

JEMPERLI 与卡铂和紫杉醇联合使用时最常见的副作用包括：手臂、手、腿和脚的神经问题；疲倦；恶心；脱发；关节疼痛；皮疹；便秘；腹泻；胃部（腹部）疼痛；呼吸短促；食欲下降；尿路感染；呕吐。

JEMPERLI 单独使用时最常见的副作用包括：疲倦和无力、红细胞计数低（贫血）、腹泻、恶心、便秘、呕吐。

这些并非 JEMPERLI 的所有可能副作用。请致电您的医生，征求有关副作用的医疗建议。

我们鼓励您拨打 1-800-FDA-1088 或访问 www.fda.gov/medwatch 向 FDA 报告处方药的不良副作用。

请参阅完整**处方信息**（包括**用药指南**），也可在 JEMPERLI.com 上获取。

商标是其各自所有者的财产。

GSK ©2024 GSK or licensor.
PMUS-DSTBROC240055 November 2024
Produced in USA.

文件名: Chinese Wellness Guide

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg