



No es una paciente real que toma JEMPERLI.

Atención a su bienestar a lo largo de su proceso de tratamiento*

*Esta información no sustituye los consejos de su proveedor de atención médica.
No dude en plantear sus inquietudes y preguntas a su equipo de atención médica.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en [JEMPERLI.com](https://www.jemperli.com).

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



Tabla de contenido

<u>Información Importante de Seguridad</u>	3
<u>Planificación del camino por delante</u>	6
<u>Participación activa en su atención</u>	8
<u>Qué puede esperar a lo largo de su proceso de tratamiento</u>	10
<u>Cuidado personal adecuado</u>	12
<u>Manejo de las dificultades emocionales</u>	13
<u>Recursos adicionales en línea</u>	14

Usos aprobados

JEMPERLI es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultas que tienen:

- un tipo de cáncer uterino llamado cáncer de endometrio (CE)
 - JEMPERLI puede utilizarse en combinación con los medicamentos quimioterapéuticos carboplatino y paclitaxel, y, posteriormente, JEMPERLI puede utilizarse solo:
 - cuando el cáncer se ha extendido fuera del útero (avanzado) ◦
 - el cáncer ha regresado.
 - JEMPERLI puede utilizarse solo:
 - cuando una prueba de laboratorio indique que el tumor es deficiente en la reparación de los errores de emparejamiento (dMMR, mismatch repair deficient) y
 - el cáncer ha regresado o se ha propagado (CE avanzado) y
 - cuando ha recibido quimioterapia con platino, y no ha funcionado o ya no funciona y
 - el cáncer no se puede tratar con cirugía ni radiación.

Se desconoce si JEMPERLI es seguro y eficaz en niños.

Información Importante de Seguridad

JEMPERLI es un medicamento que actúa sobre el sistema inmunitario para tratar determinados tipos de cáncer. JEMPERLI puede hacer que su sistema inmunitario ataque los órganos y tejidos normales en cualquier lugar del organismo y puede afectar la forma en que funcionan. En ocasiones, estos problemas pueden resultar graves o poner en peligro la vida y provocar la muerte. Usted puede tener más de uno de estos problemas al mismo tiempo. Estos problemas pueden presentarse en cualquier momento durante el tratamiento o incluso después de haberlo finalizado.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Información Importante de Seguridad (continuación)

Llame o consulte a su proveedor de atención médica (HCP, healthcare provider) de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o empeoran los existentes, incluidos los siguientes:

Problemas pulmonares. Los signos y síntomas pueden incluir tos, falta de aliento o dolor en el pecho.

Problemas intestinales. Los signos y síntomas pueden incluir diarrea o más deposiciones que de costumbre; heces negras, alquitranadas, pegajosas o con sangre o mucosidad; o sensibilidad o dolor intenso en el área del estómago (abdomen).

Problemas hepáticos. Los signos y síntomas pueden incluir piel o parte blanca de los ojos amarillentas, náuseas o vómitos intensos, dolor en el lado derecho del área del estómago (abdomen), orina oscura (como el té) o sangrado o moretones que ocurren con mayor facilidad de lo habitual.

Problemas con las glándulas hormonales. Los signos y síntomas pueden incluir dolor de cabeza inusual o que no desaparece, sensibilidad ocular a la luz, problemas oculares, latidos cardíacos rápidos, aumento de la sudoración, cansancio extremo, aumento o pérdida de peso, más hambre o sed de lo habitual, orinar con más frecuencia de la habitual, caída de cabello, sensación de frío, estreñimiento, voz más grave, mareo o desmayo, cambios de humor o comportamiento como disminución del deseo sexual, irritabilidad o tendencia al olvido.

Problemas renales. Los signos y síntomas pueden incluir cambios en la cantidad o el color de la orina, sangre en la orina, hinchazón de tobillos o pérdida de apetito.

Problemas cutáneos. Los signos y síntomas pueden incluir erupción, picazón, formación de ampollas o descamación de la piel, inflamación de los ganglios linfáticos, llagas o úlceras dolorosas en la boca, la nariz, la garganta o la zona genital; fiebre o síntomas de tipo gripal.

También pueden producirse problemas en otros órganos y tejidos. Estos no son todos los signos y síntomas de problemas del sistema inmunitario que pueden aparecer con JEMPERLI. Llame o consulte a su HCP de inmediato si aparece algún signo o síntoma nuevo o que empeore.

Los signos y síntomas pueden incluir dolor en el pecho, latidos cardíacos irregulares, dificultad respiratoria, hinchazón de tobillos, confusión, tendencia al sueño, problemas de memoria, cambios de humor o comportamiento, cuello rígido, problemas de equilibrio, sensación de hormigueo o entumecimiento de brazos o piernas, visión doble, visión borrosa, sensibilidad a la luz, dolor de los ojos, cambios en la visión, dolor o debilidad muscular constantes o intensos, calambres musculares, recuento bajo de glóbulos rojos, moretones.

Reacciones a la infusión que, a veces, pueden ser graves o potencialmente mortales. Los signos y síntomas de reacciones a la infusión pueden incluir escalofríos o temblores, picazón o erupción, rubefacción, falta de aliento o sibilancia, mareo, sensación de desmayo, fiebre, dolor de espalda o cuello.

Rechazo de un órgano trasplantado. Su HCP debe indicarle qué signos y síntomas debe notificar, y deberá vigilarla, según el tipo de trasplante de órgano que haya recibido.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg

Información Importante de Seguridad (continuación)

Complicaciones, incluida la enfermedad del injerto contra el huésped (EICH), en personas que han recibido un trasplante de médula ósea (células madre) en el que se utilizan células madre de un donante (alogénico). Estas complicaciones pueden ser graves y causar la muerte. Estas complicaciones se pueden producir si se sometió a un trasplante antes o después de recibir tratamiento con JEMPERLI. Su HCP la controlará para detectar estas complicaciones.

Recibir tratamiento médico de inmediato podría evitar que estos problemas se agraven. Su HCP la examinará para detectar estos problemas durante el tratamiento con JEMPERLI y podrá administrarle corticosteroides o medicamentos de reemplazo hormonal. Si tiene efectos secundarios graves, es posible que su HCP también deba retrasar o suspender de forma definitiva el tratamiento con JEMPERLI.

Antes de recibir JEMPERLI, informe a su HCP sobre todas sus afecciones médicas, como, por ejemplo, problemas del sistema inmunitario, como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o lupus; ha recibido un trasplante de órgano; ha recibido o tiene previsto recibir un trasplante de células madre en el que se utilicen células madre de un donante (alogénico); ha recibido radioterapia en la zona torácica; padece alguna enfermedad que afecte al sistema nervioso, como miastenia grave o síndrome de Guillain-Barré.

Si está embarazada o planea quedar embarazada, infórmelo a su HCP. JEMPERLI puede dañar al feto. Si puede quedar embarazada, su HCP le realizará una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento. Utilice un método anticonceptivo eficaz durante su tratamiento y durante los 4 meses siguientes a la última dosis de JEMPERLI. Si queda embarazada durante su tratamiento con JEMPERLI o si cree que podría estar embarazada, infórmelo de inmediato a su HCP.

Si está amamantando o planea amamantar, infórmelo a su HCP. Se desconoce si JEMPERLI pasa a través de la leche materna. No amamante durante el tratamiento con JEMPERLI y durante los 4 meses posteriores a su última dosis.

Infórmele a su HCP sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

Los efectos secundarios más frecuentes de JEMPERLI cuando se administra con carboplatino y paclitaxel incluyen problemas nerviosos en los brazos, las manos, las piernas y los pies; cansancio; náuseas; caída del cabello; dolor articular; erupción; estreñimiento; diarrea; dolor en el área del estómago (abdomen); falta de aliento; disminución del apetito; infecciones de las vías urinarias; vómitos.

Los efectos secundarios más frecuentes de JEMPERLI cuando se usa solo son cansancio y debilidad, recuento bajo de glóbulos rojos (anemia), diarrea, náuseas, estreñimiento y vómitos.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de JEMPERLI. Comuníquese con su médico para recibir asesoramiento sobre los efectos secundarios.

Se recomienda notificar los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Para ello, llame al 1-800-FDA-1088 o visite www.fda.gov/medwatch.

Consulte la [Información de Prescripción completa](#), incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



No es una paciente real que toma JEMPERLI.

Información Importante de Seguridad

JEMPERLI es un medicamento que actúa sobre el sistema inmunitario para tratar determinados tipos de cáncer. JEMPERLI puede hacer que su sistema inmunitario ataque los órganos y tejidos normales en cualquier lugar del organismo y puede afectar la forma en que funcionan. En ocasiones, estos problemas pueden resultar graves o poner en peligro la vida y provocar la muerte. Usted puede tener más de uno de estos problemas al mismo tiempo. Estos problemas pueden presentarse en cualquier momento durante el tratamiento o incluso después de haberlo finalizado.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Planificación del camino por delante



Cuando recibe un diagnóstico de cáncer de endometrio avanzado o recidivante, el futuro puede parecer incierto. A lo largo de su proceso, es normal que surjan preguntas y que experimente una mezcla de emociones.



Queremos brindarle nuestra ayuda. Nuestro objetivo es reducir la incertidumbre mediante la entrega de información sobre el cáncer de endometrio y lo que puede esperar.

Información sobre el cáncer de endometrio

El cáncer de endometrio es:

- Un tipo de cáncer que comienza en el tejido que recubre el útero.
- La neoplasia maligna ginecológica más frecuente en los Estados Unidos.



**Se diagnostican
unos 61,000 casos**

de cáncer de endometrio al año en EE. UU.

¿Qué significa “avanzado o recidivante”?

“Avanzado o recidivante” significa que el cáncer de endometrio se ha extendido fuera del útero o ha reaparecido después del tratamiento. Al igual que usted, aproximadamente **1 de cada 4 personas con cáncer de endometrio enfrenta una enfermedad avanzada o recidivante.**

Información Importante de Seguridad (continuación)

Llame o consulte a su proveedor de atención médica (HCP, Healthcare Provider) de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o empeoran los existentes, incluidos los siguientes:

Problemas pulmonares. Los signos y síntomas pueden incluir tos, falta de aliento o dolor en el pecho.

Problemas intestinales. Los signos y síntomas pueden incluir diarrea o más deposiciones que de costumbre; heces negras, alquitranadas, pegajosas o con sangre o mucosidad; o sensibilidad o dolor intenso en el área del estómago (abdomen).

Problemas hepáticos. Los signos y síntomas pueden incluir piel o parte blanca de los ojos amarillentas, náuseas o vómitos intensos, dolor en el lado derecho del área del estómago (abdomen), orina oscura (como el té) o sangrado o moretones que ocurren con mayor facilidad de lo habitual.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg



Descripción general del equipo de atención

Si bien su médico oncólogo dirigirá el plan de tratamiento, un equipo integral de especialistas estará a su disposición para brindarle atención y responder sus preguntas. Esto puede incluir lo siguiente:

Supervisión de la atención y del tratamiento Atención diaria

- Oncólogo médico
- Ginecólogo oncólogo
- Cirujano oncológico
- Asistente médico (PA, Physician Assistant) oncológico
- Personal de enfermería especializado (NP, Nurse Practitioner) en oncología
- Personal de enfermería de Oncología
- Administrador de casos
- Personal de enfermería que realiza la infusión

Gestión de atención adicional

- Asesor de pacientes
- Equipo de cuidados paliativos
- Trabajador social clínico
- Profesional de salud mental

Otros miembros del equipo

- Dietista/nutricionista
- Radiólogo
- Terapeuta de rehabilitación
- Farmacéutico clínico oncológico

Información Importante de Seguridad (continuación)

Llame o consulte a su proveedor de atención médica (HCP) de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o empeoran los existentes, incluidos los siguientes (continuación):

Problemas con las glándulas hormonales. Los signos y síntomas pueden incluir dolor de cabeza inusual o que no desaparece, sensibilidad ocular a la luz, problemas oculares, latidos cardíacos rápidos, aumento de la sudoración, cansancio extremo, aumento o pérdida de peso, más hambre o sed de lo habitual, orinar con más frecuencia de la habitual, caída de cabello, sensación de frío, estreñimiento, voz más grave, mareo o desmayo, cambios de humor o comportamiento como disminución del deseo sexual, irritabilidad o tendencia al olvido.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg

Participación activa en su atención

¡Usted es la persona más importante de su equipo de atención médica! El primer paso para atender sus necesidades es expresar su opinión. No dude en hacer preguntas y compartir sus preferencias.

Asumir un rol activo en cada etapa del proceso:



Puede ayudarla a comprender esta compleja enfermedad y los objetivos de su tratamiento.



Puede prepararla mejor para los posibles efectos secundarios.



Puede ayudarla a sentir que tiene un mayor control de la situación.

Tenga presente que es normal no asimilar o comprender todo de inmediato. Si se siente cansada o abrumada, no dude en pedir que le repitan la información.

Pida ayuda

Puede ser difícil darse cuenta de que no puede hacerlo todo sola. Y no es fácil pedir ayuda. Sin embargo, el cáncer de endometrio y su tratamiento pueden ser agotadores. Está bien permitir que la gente le brinde el apoyo que necesita durante este difícil momento.



Recomendación práctica

Si no puede tomar notas durante una consulta médica, solicite a su equipo médico que le proporcione una copia impresa de la información más importante.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Llame o consulte a su proveedor de atención médica (HCP) de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o empeoran los existentes, incluidos los siguientes (continuación):

Problemas renales. Los signos y síntomas pueden incluir cambios en la cantidad o el color de la orina, sangre en la orina, hinchazón de tobillos o pérdida de apetito.

Problemas cutáneos. Los signos y síntomas pueden incluir erupción, picazón, formación de ampollas o descamación de la piel, inflamación de los ganglios linfáticos, llagas o úlceras dolorosas en la boca, la nariz, la garganta o la zona genital; fiebre o síntomas de tipo gripal.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg



No es una paciente real que toma JEMPERLI.

Información Importante de Seguridad (continuación)

También pueden producirse problemas en otros órganos y tejidos. Estos no son todos los signos y síntomas de problemas del sistema inmunitario que pueden aparecer con JEMPERLI. Llame o consulte a su HCP de inmediato si aparece algún signo o síntoma nuevo o que empeore. Los signos y síntomas pueden incluir dolor en el pecho, latidos cardíacos irregulares, dificultad respiratoria, hinchazón de tobillos, confusión, tendencia al sueño, problemas de memoria, cambios de humor o comportamiento, cuello rígido, problemas de equilibrio, sensación de hormigueo o entumecimiento de brazos o piernas, visión doble, visión borrosa, sensibilidad a la luz, dolor de los ojos, cambios en la visión, dolor o debilidad muscular constantes o intensos, calambres musculares, recuento bajo de glóbulos rojos, moretones.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Qué puede esperar a lo largo de su proceso de tratamiento

Tras el diagnóstico, tendrá que programar citas médicas, hacerse análisis de sangre y recibir tratamientos. Además, posiblemente tenga que someterse a pruebas y estudios exploratorios. Quizá todo esto le parezca abrumador, pero si va paso a paso le resultará más fácil abordarlo.

Consultas médicas: una vez que usted y su oncólogo hayan acordado un plan de tratamiento, es probable que comience a reunirse con los miembros del equipo de atención. En estas reuniones, se abordarán sus necesidades alimentarias, económicas y de apoyo, así como sus objetivos para el tratamiento. No dude en compartir lo que más le importa, ya sea su vida familiar, su carrera profesional o sus actividades favoritas. Puede estar segura de que el equipo estará encantado de abordar cualquier inquietud que tenga sobre lo que le espera.

Pruebas: cada plan de tratamiento es único, pero la mayoría de las personas con cáncer de endometrio se someten a pruebas similares a lo largo del tratamiento. Consulte a su equipo de atención para informarse sobre las pruebas que puede necesitar o que ya le han realizado. Estas pueden incluir:

- **Biopsia:** procedimiento para extirpar una pequeña muestra de tejido para analizarla.
- **Prueba de biomarcadores:** análisis de laboratorio que examina si su tumor presenta determinados genes, proteínas u otros factores que pueden proporcionar información crucial sobre el cáncer. Estos datos ayudan a su médico a determinar qué opciones de tratamiento, incluido JEMPERLI, pueden ser adecuadas para usted.
- **Tomografía computarizada (TC):** imágenes que muestran los órganos internos.
- **Colposcopia:** procedimiento que permite evaluar las células del cuello uterino.
- **Dilatación y legrado (D y L):** procedimiento para extirpar una pequeña muestra de tejido del útero para analizarla.
- **Examen ginecológico o examen pélvico:** el médico examina el útero, la vagina, los ovarios y el recto para detectar cualquier hallazgo inusual.
- **Resonancia magnética (RM):** exploraciones que utilizan ondas de radio e imanes potentes para proporcionar una imagen detallada del interior del cuerpo.
- **TEP (tomografía por emisión de positrones):** imágenes que muestran la ubicación de las células cancerosas.
- **Ecografía:** utiliza ondas sonoras para crear una imagen de sus órganos internos.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Reacciones a la infusión que, a veces, pueden ser graves o potencialmente mortales. Los signos y síntomas de reacciones a la infusión pueden incluir escalofríos o temblores, picazón o erupción, rubefacción, falta de aliento o sibilancia, mareo, sensación de desmayo, fiebre, dolor de espalda o cuello.

Rechazo de un órgano trasplantado. Su HCP debe indicarle qué signos y síntomas debe notificar, y deberá controlarla, según el tipo de trasplante de órgano que haya recibido.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg

Tratamiento con JEMPERLI

JEMPERLI es una inmunoterapia que está aprobada para tratar el tipo de cáncer de endometrio avanzado o recidivante que usted tiene. Esto quiere decir que está diseñado para trabajar con el sistema inmunitario del cuerpo para atacar las células cancerosas.



Según el momento en que se encuentre en el proceso, su médico puede recetarle:

- JEMPERLI en combinación con los medicamentos quimioterapéuticos carboplatino y paclitaxel y, posteriormente, JEMPERLI solo, para atacar el cáncer de múltiples maneras.
- JEMPERLI por sí solo.

Su proveedor de atención médica determinará cuántos tratamientos necesita y evaluará si presenta efectos secundarios. Si no puede asistir a alguna cita, comuníquese con su proveedor lo antes posible para reprogramarla.



Qué esperar el día del tratamiento:

- JEMPERLI se administra mediante infusión intravenosa (IV), es decir, en una vena.
- La infusión durará aproximadamente 30 minutos.
- Puede sentir frío, así que le recomendamos llevar una manta, un suéter o una almohadilla térmica.
- Le recomendamos tomarse con calma el resto del día.
- Si desea que su persona de apoyo la acompañe, pregunte al personal del centro de infusión si está permitido.



Recomendación práctica

Revise la Información Importante de Seguridad en este folleto. Póngase en contacto con su proveedor de atención médica o visítelo de inmediato si nota cualquier signo o síntoma nuevo o que haya empeorado, ya que podrían ser señales de problemas más graves o potencialmente mortales. Si desea obtener más información sobre los efectos secundarios, visite JEMPERLI.com.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Complicaciones, incluida la enfermedad del injerto contra el huésped (EICH), en personas que han recibido un trasplante de médula ósea (células madre) en el que se utilizan células madre de un donante (allogénico). Estas complicaciones pueden ser graves y causar la muerte. Estas complicaciones se pueden producir si se sometió a un trasplante antes o después de recibir tratamiento con JEMPERLI. Su HCP la controlará para detectar estas complicaciones.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg

Cuidado personal adecuado

Durante el tratamiento del cáncer, su sistema inmunitario realizará un gran esfuerzo. Posiblemente le interese saber cómo cuidarse de manera adecuada durante todo el proceso. Hable con su equipo de atención médica sobre sus recomendaciones, que pueden incluir:



Mejorar su nutrición: converse con su equipo sobre sus objetivos nutricionales y los alimentos que le proporcionarán la combinación adecuada de proteínas, vitaminas y minerales. Mantener una buena alimentación puede ayudarla a aumentar sus niveles de energía.



Beber mucho líquido: además de agua, puede consumir jugos, bebidas con electrolitos y otros líquidos sin cafeína para mantenerse hidratada, de acuerdo con las recomendaciones de su equipo médico. No olvide consultarles sobre la cantidad que puede beber de forma segura.



Descansar lo suficiente: intente dormir entre 7 y 8 horas cada noche para sentirse renovada.



Mantenerse activa: procure mantenerse activa cada día; un paseo diario a pie puede mejorar su estado de ánimo. Antes de comenzar cualquier rutina de ejercicios nueva, asegúrese de consultar a su equipo médico cuál es el nivel de actividad más adecuado para usted.



Recomendación práctica

No tiene que enfrentar esto sola. Puede encontrar grupos de apoyo en línea (consulte la lista en la página 14) o comunicarse con su equipo de atención. Ellos comprenden cómo se siente y disponen de recursos que pueden serle útiles.

Información Importante de Seguridad (continuación)

Recibir tratamiento médico de inmediato podría evitar que estos problemas se agraven. Su HCP la examinará para detectar estos problemas durante el tratamiento con JEMPERLI y podrá administrarle corticosteroides o medicamentos de reemplazo hormonal. Si tiene efectos secundarios graves, es posible que su HCP también deba retrasar o suspender de forma definitiva el tratamiento con JEMPERLI.

Antes de recibir JEMPERLI, informe a su HCP sobre todas sus afecciones médicas, como, por ejemplo, problemas del sistema inmunitario, como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o lupus; ha recibido un trasplante de órgano; ha recibido o tiene previsto recibir un trasplante de células madre en el que se utilicen células madre de un donante (allogénico); ha recibido radioterapia en la zona torácica; padece alguna enfermedad que afecte al sistema nervioso, como miastenia grave o síndrome de Guillain-Barré.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg

Manejo de las dificultades emocionales

Es posible que sienta ansiedad o estrés a lo largo del proceso de tratamiento. Su equipo de atención médica puede orientarla sobre los recursos disponibles que pueden ser de utilidad.

Existen muchos signos de ansiedad, algunos de los cuales pueden estar relacionados con los efectos secundarios de JEMPERLI. Estos síntomas pueden manifestarse de diversas maneras, por lo **que es fundamental que informe a su equipo de atención sobre cualquier cambio que experimente.**

Si nota signos de estrés, es importante que tome medidas para cuidar su salud mental. Hable con su equipo de atención médica sobre cómo manejar el estrés; ellos pueden sugerirle algunos consejos útiles, como:

- Llamar a un amigo y hablar sobre sus sentimientos.
- Meditar o practicar la respiración profunda (explore aplicaciones que le enseñen cómo hacerlo).
- Realizar una sesión de yoga de 10 minutos (busque videos en línea).
- Probar la aromaterapia utilizando aceites esenciales con un difusor o en bolas de algodón.
- Unirse a un grupo de apoyo.
- Dar un pequeño paseo a pie.
- Contactar a un consejero o terapeuta.



Recomendación práctica

Es posible que no se sienta en su mejor momento durante el tratamiento, pero incluso una pequeña cantidad de actividad puede ayudarla a sentirse mejor. **Consulte a su equipo médico antes de comenzar un nuevo plan de ejercicio.**

Información Importante de Seguridad (continuación)

Si está embarazada o planea quedar embarazada, infórmelo a su HCP. JEMPERLI puede dañar al feto. Si puede quedar embarazada, su HCP le realizará una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento. Utilice un método anticonceptivo eficaz durante su tratamiento y durante los 4 meses siguientes a la última dosis de JEMPERLI. Si queda embarazada durante su tratamiento con JEMPERLI o si cree que podría estar embarazada, infórmelo de inmediato a su HCP.

Si está amamantando o planea amamantar, infórmelo a su HCP. Se desconoce si JEMPERLI pasa a través de la leche materna. No amamante durante el tratamiento con JEMPERLI y durante los 4 meses posteriores a la última dosis.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de este documento, así como la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Inyección 500 mg



Recursos adicionales en línea

Información sobre el cáncer

American Cancer Society
cancer.org

Facing Hereditary Cancer EMPOWERED (FORCE)
facingourrisk.org

Tenga en cuenta lo siguiente: Estos recursos son externos a GSK. GSK no tiene control sobre el contenido o la información proporcionada a través de estos recursos y, por lo tanto, no garantiza su exactitud o integridad. Estas organizaciones, incluida la American Cancer Society, no respaldan ningún producto o servicio.

Apoyo y defensa

CancerCare
cancercare.org

Endometrial Cancer Action Network for African-Americans (ECANA)
ecanawomen.org

Foundation for Women's Cancer
foundationforwomenscancer.org

Patient Empowerment Network
powerfulpatients.org

SHARE Cancer Support
sharecancersupport.org

Información Importante de Seguridad (continuación)

Infórmele a su HCP sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

Los efectos secundarios más frecuentes de JEMPERLI cuando se administra con carboplatino y paclitaxel incluyen problemas nerviosos en los brazos, las manos, las piernas y los pies; cansancio; náuseas; caída del cabello; dolor articular; erupción; estreñimiento; diarrea; dolor en el área del estómago (abdomen); falta de aliento; disminución del apetito; infecciones de las vías urinarias; vómitos.

Los efectos secundarios más frecuentes de JEMPERLI cuando se usa solo son cansancio y debilidad, recuento bajo de glóbulos rojos (anemia), diarrea, náuseas, estreñimiento y vómitos.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de JEMPERLI. Comuníquese con su médico para recibir asesoramiento sobre los efectos secundarios.

Se recomienda notificar los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Para ello, llame al 1-800-FDA-1088 o visite www.fda.gov/medwatch.

Consulte la [Información de Prescripción](#) completa, incluida la [Guía del Medicamento](#), también disponible en JEMPERLI.com.

Las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

GSK ©2024 GSK or licensor.
PMUS-DSTBROC240054 December 2024
Produced in USA.

Nombre del archivo: Spanish Wellness Guide

Jemperli 
(dostarlimab-gxly) Injection 500 mg